ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

Session 2015

CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT
D'INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

Épreuve obligatoire de
MATHÉMATIQUES

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

Cette épreuve comporte :

- 1 page de garde
- 2 pages d'instructions pour remplir le QCM recto/verso
- 11 pages de texte recto/verso

**L'USAGE DE CALCULATRICES, DE TELEPHONES PORTABLES
OU DE DOCUMENTS PERSONNELS N'EST PAS AUTORISE**

ÉPREUVE OBLIGATOIRE DE MATHÉMATIQUES

A LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT

L'épreuve obligatoire de mathématiques de ce concours est un questionnaire à choix multiple qui sera corrigé automatiquement par une machine à lecture optique.

ATTENTION, IL NE VOUS EST DÉLIVRÉ QU'UN SEUL QCM

- 1) Vous devez coller dans la partie droite prévue à cet effet, l'étiquette correspondant à l'épreuve que vous passez, c'est-à-dire « épreuve obligatoire de mathématiques ».

POSITIONNEMENT DES ÉTIQUETTES

Pour permettre la lecture optique de l'étiquette, positionner celle-ci en **position verticale** avec les chiffres d'identification **à gauche** (le trait vertical devant traverser la totalité des barres de ce code).

EXEMPLES :

- 2) Pour remplir ce QCM, vous devez utiliser un **STYLO BILLE** ou une **POINTE FEUTRE** de couleur **NOIRE**.
- 3) Utilisez le sujet comme brouillon (ou les feuilles de brouillons qui vous sont fournies à la demande par la surveillante qui s'occupe de votre rangée) et ne retranscrivez vos réponses qu'après vous être relu soigneusement.
- 4) Votre QCM ne doit pas être souillé, froissé, plié, écorné ou porter des inscriptions superflues, sous peine d'être rejeté par la machine et de ne pas être corrigé.

Tournez la page S.V.P.

- 5) A chaque question numérotée entre 1 et 40, correspond sur la feuille-réponses une ligne de cases qui porte le même numéro (les lignes de 41 à 100 seront neutralisées). Chaque ligne comporte 5 cases A, B, C, D, E.

Pour chaque ligne numérotée de 01 à 40, vous vous trouvez en face de 4 possibilités :

- ▶ soit vous décidez de ne pas traiter cette question, *la ligne correspondante doit rester vierge.*
- ▶ soit vous jugez que la question comporte une seule bonne réponse : *vous devez noircir l'une des cases A, B, C, D.*
- ▶ soit vous jugez que la question comporte deux réponses exactes : *vous devez noircir deux des cases A, B, C, D et deux seulement.*
- ▶ soit vous jugez qu'aucune des réponses proposées A, B, C, D n'est bonne : *vous devez alors noircir la case E.*

Chaque question comporte, au plus, deux réponses exactes

Attention, toute réponse fausse entraîne pour la question correspondante une pénalité dans la note

EXEMPLES DE RÉPONSES :

Question 1 : $1^2 + 2^2$ vaut :

- A) 3 B) 5 C) 4 D) -1

Question 2 : le produit (-1) (-3) vaut :

- A) -3 B) -1 C) 4 D) 0

Question 3 : Une racine de l'équation $x^2 - 1 = 0$ est :

- A) 1 B) 0 C) -1 D) 2

Vous marquerez sur la feuille réponse :

1	☐ A ☐	☒ B ☐	☐ C ☐	☐ D ☐	☐ E ☐
2	☐ A ☐	☐ B ☐	☐ C ☐	☐ D ☐	☒ E ☐
3	☒ A ☐	☐ B ☐	☒ C ☐	☐ D ☐	☐ E ☐

Problème I.

Soit S l'ensemble des suites (a_n) dont le terme général a_n est un nombre complexe.

Soient : I l'ensemble des suites (a_n) telles que la série $\sum |a_n|$ de terme général $|a_n|$ converge et J l'ensemble des suites (a_n) telles que la série $\sum |a_n|^2$ de terme général $|a_n|^2$ converge

✂ Question 1 - Soit (a_n) un élément de I , on a alors :

- A) I est un sous espace vectoriel de S
- B) I n'est pas un sous espace vectoriel de S
- C) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$
- D) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| > 0$

Question 2 - L'ensemble I vérifie :

- A) I n'est pas inclus dans l'ensemble des suites convergeant vers 0
- B) I est inclus dans l'ensemble des suites convergentes dans $\mathbb{C}$
- C) I n'est pas inclus dans l'ensemble des suites bornées
- D) J est inclus dans I

✂ Question 3 - Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . On a

- A) si $R > 1$ alors (a_n) appartient à I
- B) si $R < 1$ alors (a_n) appartient à I
- C) si $R > 1$ alors (a_n) n'appartient pas à I
- D) si $R < 1$ alors (a_n) n'appartient pas à I

✂ Question 4 - Soit la série $\sum \frac{1}{n^2} z^n$, $n > 0$

- A) son rayon de convergence est ∞
- B) son rayon de convergence vaut 1
- C) la suite (a_n) de terme général $\frac{1}{n^2} \in I$
- D) la suite (a_n) de terme général $\frac{1}{n^2} \notin I$

✗ Question 5 - Soit la série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{b^n}$ où b est un entier > 1 , alors

- A) son rayon de convergence est $R = b$
- B) son rayon de convergence est $R = 1/b$
- C) la somme de la série est $\frac{1}{b-x}$
- D) la somme de la série est $\frac{1}{x-b}$

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = \frac{1}{(2-x)(3-x)}$

$\downarrow$ $\downarrow$
 u v

✗ Question 6 - On a :

- A) f est développable en série entière autour de $x=0$ et son rayon de convergence vaut 1
- B) f est développable en série entière autour de $x=0$ et son rayon de convergence vaut 2
- C) f est développable en série entière autour de $x=0$, son rayon de convergence vaut 3
- D) f n'est pas développable en série entière autour de $x=0$

Question 7 - La dérivée $f^{(n)}(x)$ d'ordre n de la fonction $f(x)$ est :

A) $f^{(n)}(x) = \frac{1}{n!} \frac{(2-x)^n - (3-x)^n}{(x^2 + 5x - 6)^n}$ $n = 1$

B) $f^{(n)}(x) = \frac{1}{n!} \frac{(2-x)^n - (3-x)^n}{(x^2 - 5x + 6)^n}$

C) $f^{(n)}(x) = \frac{1}{n!} \frac{(3-x)^{n+1} - (2-x)^{n+1}}{(x^2 - 5x + 6)^{n+1}}$

D) $f^{(n)}(x) = \frac{(3-x)^{n+1} - (2-x)^{n+1}}{(x^2 - 5x + 6)^{n+1}}$

Question 8 - Considérons la suite (a_n) définie par $a_n = f^{(n)}(0)$

- A) Cette suite n'appartient pas à $\mathbb{I}$
- B) Cette suite appartient à $\mathbb{I}$
- C) L'expression de son terme général est $\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{3^{n+1}}$
- D) L'expression de son terme général est $\frac{1}{3^{n+1}} - \frac{1}{2^{n+1}}$

Dans toute la suite on suppose que n est un entier tel que $n \geq 2$ et p et q deux entiers ≥ 1 . On note I_n l'intervalle $\left[n - \frac{1}{n^p}, n + \frac{1}{n^p} \right]$. On définit alors une application g de $[1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ de la façon suivante :

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin I_n \\ n^q(n^p x + 1 - n^{p+1}) & \text{si } x \in \left[n - \frac{1}{n^p}, n \right] \\ n^q(-n^p x + 1 + n^{p+1}) & \text{si } x \in \left[n, n + \frac{1}{n^p} \right] \end{cases}$$

et on note : $A_n = \int_{n - \frac{1}{n^p}}^{n + \frac{1}{n^p}} g(x) dx$ et $B_n = \int_{n - \frac{1}{n^p}}^{n + \frac{1}{n^p}} (g(x))^2 dx$

✗ Question 9 – L'application $g(x)$

A) est C^0 sur $\mathbb{R}$

B) n'est pas C^0 sur $\mathbb{R}$

C) est C^1 sur $\mathbb{R}$

D) n'est pas C^1 sur $\mathbb{R}$

$$n^q \left(\frac{n^p}{2} x^2 + (-n^{p+1}) x \right)$$

$$n^q \left(-\frac{n^p}{2} x^2 + (1 + n^{p+1}) x \right)$$

✗ Question 10 – La valeur de A_n est :

A) $\frac{1}{n^{p-q}}$

B) $\frac{1}{n^{q-p}}$

C) $(-1)^n \frac{1}{n^{p-q}}$

D) $(-1)^n \frac{1}{n^{q-p}}$

✗ Question 11 – La valeur de B_n est :

A) $\frac{2}{3} \frac{1}{n^{p-2q}}$

~~B) $\frac{3}{2} \frac{1}{n^{2p-q}}$~~

~~C) $\frac{1}{n^{p-q}}$~~

D) $\frac{1}{n^{2q-p}}$

✗ Question 12 - A_n est le terme d'une série convergente sous la condition que:

- A) $q-p > -1$
- B) $q-p < -1$
- ~~C)~~ $p-q \geq 1$
- ~~D)~~ $p-q \leq 1$

✗ Question 13 - B_n est le terme d'une série convergente sous la condition que:

- ~~A)~~ $p-2q < 1$
- ~~B)~~ $2q-p > 1$
- ~~C)~~ $p-2q \geq -1$
- D) $2q-p \leq -1$

✗ Question 14 - On veut que les séries associées à A_n et B_n soient convergentes en même temps:

- ~~A)~~ cela n'est pas possible
- ~~B)~~ cela est possible si : $p = 2$ et $q = 3$
- ~~C)~~ cela est possible si : $p = 4$ et $q = 2$
- ~~D)~~ cela est possible si : $p = 3$ et $q = 2$

Problème II.

Soit $f(x)$ une fonction définie sur l'intervalle $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$, de classe C^{n+1} , avec $n \geq 1$. On utilise dans le problème la norme: $N_{\infty, I}(f) = \sup_{x \in I} |f(x)|$

I - On veut trouver une expression de $f(b)$ en fonction de $f(a)$ et des dérivées de la fonction $f(x)$ au point a . Pour cela on introduit la fonction :

$$F(x) = f(b) - f(x) - (b-x)f'(x) - \dots - \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k)}(x) - \dots - \frac{(b-x)^n}{n!} f^{(n)}(x) - \frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!} A$$

La constante A sera calculée en imposant que la fonction $F(x)$ soit nulle en a , $F(a) = 0$.

Question 15 - On a :

- ~~A)~~ $F(b) \neq 0$
- B) $F'(x) = \frac{(b-x)^n}{n!} (A - f^{(n)}(x))$
- ~~C)~~ il existe $c \in]a, b[$ tel que $F'(c) = 0$
- D) il existe $c \in]a, b[$ tel que $F(c) = 0$

7 Question 16 – On peut alors écrire, $c \in]a, b[$:

- A) $f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(c)$
- B) $f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + (-1)^n \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(c)$
- C) $f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$
- D) $f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$

Question 17 – Si on pose $a = x$ et $b = x + \lambda$, on peut alors écrire :

- A) $f(x + \lambda) = f(x) + \sum_{k=1}^n \lambda^k f^{(k)}(x) + \frac{\lambda^n}{n!} f^{(n)}(x + \theta\lambda) \theta \in]0, 1[$
- B) $f(x + \lambda) = f(x) + \sum_{k=1}^n \lambda^k f^{(k)}(x) + (-1)^n \frac{\lambda^n}{n!} f^{(n)}(x - \theta\lambda) \theta \in]0, 1[$
- C) $f(x + \lambda) = f(x) + \sum_{k=1}^n \lambda^k f^{(k)}(x) + \frac{\lambda^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x - \theta\lambda) \theta \in]0, 1[$
- D) $f(x + \lambda) = f(x) + \sum_{k=1}^n \lambda^k f^{(k)}(x) + \frac{\lambda^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x + \theta\lambda) \theta \in]0, 1[$

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n h^k$$

8 Question 18 – On désire exprimer le polynôme $P(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 4x + 1$, en fonction de $X = x+1$, en utilisant les résultats précédents on obtient comme expression:

- A) $X^4 + 6X^3 + 12X^2 + 8X + 2$
- B) $X^4 + 12X^3 + 6X^2 - 2X - 2$
- C) $X^4 - 5X^3 + 8X^2 - X - 2$
- D) $X^4 - 12X^3 - 6X^2 + X - 2$

$$P'(x) = 4x^3 - 3x^2 - 2x + 4$$

$$f(a+h) = f(a) + h f'(a) + \dots$$

$$x^4 - x^3 - x^2 + 4x + 1 \quad k=0$$

$$+ 12x^3 - 6x^2 - 2x - 2 \quad k=1$$

$$+ 24x^2 + 6x + 24 \quad k=2$$

$$- 24x + 6 + 24 \quad k=3$$

$$P''(x) = 12x^2 - 6x - 2$$

$$P'''(x) = 24x - 6$$

$$P''''(x) = 24$$

$$= X^4 - 5X^3 + 14X^2 - 24X + 19$$

II – On suppose maintenant que $f(x)$ est une fonction positive de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ et telle que sa dérivée seconde $f''(x)$ soit bornée.

Question 19 - Pour tous x et λ éléments de $\mathbb{R}$ on peut alors écrire :

A) $f(x+\lambda) = f(x) + \lambda f'(x) + \frac{\lambda^2}{2} f''(x+\theta\lambda) \quad \theta \in]0,1[$

~~B)~~ $f(x+\lambda) = f(x) - \lambda f'(x) + \frac{\lambda^2}{2} f''(x-\theta\lambda) \quad \theta \in]0,1[$

~~C)~~ $f(x+\lambda) = f(x) + \lambda f'(x) - \frac{\lambda^2}{2} f''(x+\theta\lambda) \quad \theta \in]0,1[$

D) $f(x+\lambda) = f(x) + \lambda f'(x) + \frac{\lambda^2}{2} f''(x-\theta\lambda) \quad \theta \in]0,1[$

~~X~~ **Question 20** – Pour tous x et λ éléments de $\mathbb{R}$, on a :

A) $f(x+\lambda) \leq f(x) + \lambda f'(x) + \frac{\lambda^2}{2} N_{\infty, \mathbb{R}}(f'')$

~~B)~~ $f(x+\lambda) \leq f(x) + \lambda f'(x) - \frac{\lambda^2}{2} N_{\infty, \mathbb{R}}(f')$

~~C)~~ $f(x+\lambda) \leq f(x) + \lambda f'(x) - \frac{\lambda^2}{2} N_{\infty, \mathbb{R}}(f'')$

~~D)~~ $f(x+\lambda) \leq f(x) - \lambda f'(x) + \frac{\lambda^2}{2} N_{\infty, \mathbb{R}}(f')$

~~X~~ **Question 21** – On a :

A) $\frac{\lambda^2}{2} N_{\infty, \mathbb{R}}(f'') + \lambda f'(x) + f(x) \geq 0$

~~B)~~ $\frac{\lambda^2}{2} N_{\infty, \mathbb{R}}(f'') + \lambda f'(x) + f(x) \leq 0$

C) si $N_{\infty, \mathbb{R}}(f'')$ est non nulle alors $|f'(x)| \leq (2 N_{\infty, \mathbb{R}}(f'') \cdot f(x))^{1/2}$

D) si $N_{\infty, \mathbb{R}}(f'')$ est non nulle alors $|f'(x)| \geq (2 N_{\infty, \mathbb{R}}(f'') \cdot f(x))^{1/2}$

$$\frac{1}{2} N_{\infty}(f'') + f'(a) + f(a) \geq 0$$

$$-f'(a) \leq \frac{N_{\infty}(f'')}{2} + f(a)$$

~~X~~ **Question 22** – Si $N_{\infty, \mathbb{R}}(f'')$ est nulle, alors :

A) $f(x)$ est une fonction affine

B) $f(x)$ est la fonction nulle

C) $f'(x) = 0$

D) $f'(x) > 0$

~~X~~ **Question 23** – On pose $g(x) = \sqrt{f(x)}$

A) $g(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$

~~B)~~ $g(x)$ est dérivable en tout point x

C) $g(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable en tout point x où $f(x) \neq 0$

D) $g(x)$ n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$

$$f(a) \geq 0$$

✗ Question 24 – Soit x_0 un élément de $\mathbb{R}$ tel que $f(x_0)=0$, on a :

- A) $f'(x_0) > 0$
- B) $f'(x_0) > 1$
- C) $f'(x_0) = 0$
- ✗ D) $f'(x_0)$ n'est pas définie

✗ Question 25 – On peut alors en déduire que pour tout x élément de $\mathbb{R}$, $x \neq x_0$, il existe un réel c , compris entre x_0 et x tel que :

- A) $f(x) = \frac{1}{2}(x-x_0)^2 f'(c)$
- ✗ B) $f(x) = \frac{1}{2}(x-x_0)^2 f''(c)$
- C) $f(x-c) = \frac{1}{2}(x-x_0)^2$
- ✗ D) $f''(c) < 0$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2}$$

✗ Question 26 – On a :

- A) En étudiant la variation de $f(x)$ au voisinage de x_0 on montre que $f''(x_0) \geq 0$
- B) En étudiant la variation de $f(x)$ au voisinage de x_0 on montre que $f''(x_0) \leq 0$
- C) si $f''(x_0) > 0$ alors $g(x)$ n'est pas dérivable en x_0
- D) si $f''(x_0) > 0$ alors $g(x)$ est dérivable en x_0

Problème III.

I – Le but de cette première partie est de déterminer les coefficients d'un polynôme $P(x)$ de degré n à partir de ses racines $x_i \in \mathbb{C}$. On écrit le polynôme sous la forme :

$$P(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n \text{ où } x \in \mathbb{C} \text{ et } a_i \in \mathbb{R}, i \in [1, n]$$

On note $S_k = \sum_{i=1}^n (x_i)^k, k \in [1, n]$

✗ Question 27 – Pour $\lambda \in \mathbb{C}$ on effectue la division euclidienne de $P(x)$ par $(x-\lambda)$ et on note :

$Q(x) = b_0 x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + b_2 x^{n-3} + \dots + b_{n-2} x + b_{n-1}$ le polynôme quotient et par b_n le reste. On a alors :

- A) b_n est un polynôme en x de degré 1
- B) $b_n = 0$ si $\lambda = x_i$
- ✗ C) pour tout $k \in [1, n-1], b_k \in \mathbb{R}$
- D) $b_n = a_n - \lambda b_{n-1}$

$$P = Q(x-\lambda) + b_n$$

$$- b_{n-1} \lambda$$

$$a_n = b_{n-1} b_{n-1} \lambda$$

✗ **Question 28** – On veut maintenant établir l'expression en fonction de λ des différents $b_k, k \in [1, n]$.
On obtient :

- A) $b_k = \lambda^k - a_1 \lambda^{k-1} + \dots + (-1)^i a_i \lambda^{k-i} + \dots + 1$
- B) $b_k = a_k \lambda^k - a_{k-1} \lambda^{k-1} + \dots + (-1)^i a_{k-i} \lambda^{k-i} + \dots + 1$
- C) $b_k = \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \dots + a_i \lambda^{k-i} + \dots + a_k$
- D) $b_k = a_k \lambda^k + a_{k-1} \lambda^{k-1} + \dots + a_{k-i} \lambda^{k-i} + \dots + 1$

Question 29 – On utilise le résultat précédent pour exprimer la somme :

$$E(x) = \sum_{i=1}^n \frac{P(x)}{x - x_i} = c_0 x^{n-1} + c_1 x^{n-2} + c_2 x^{n-3} + \dots + c_{n-2} x + c_{n-1}. \text{ On obtient :}$$

- A) $c_0 = 1$
- B) $c_k = S_k + a_1 S_{k-1} + \dots + a_{k-1} (S_1 + n a_k)$
- C) $S_k + a_1 S_{k-1} + \dots + a_{k-1} S_1 = 0$
- D) $S_k + a_1 S_{k-1} + \dots + a_{k-1} (S_1 + a_k) = 0$

$$S_k = \sum_{i=1}^m (x_i)^k$$

Question 30 – En exprimant $P'(x) = \frac{dP(x)}{dx}$ à l'aide de $E(x)$ on obtient : $P'(x) = \sum_{k=1}^m$

- A) $S_1 + a_1 = 0$
- B) $S_k + a_1 S_{k-1} + a_2 S_{k-2} + \dots + (k-1) a_k = 0, k \in [2, n]$
- C) $S_k + a_{k-1} S_{k-1} + a_{k-2} S_{k-2} + \dots + k a_k = 0, k \in [2, n]$
- D) $S_k + a_1 S_{k-1} + a_2 S_{k-2} + \dots + k a_k = 0, k \in [1, n-1]$

En complétant les résultats précédents avec la relation obtenue en calculant $\sum_{i=1}^n P(x_i)$ on obtient ainsi n relations permettant la détermination de tous les coefficients de $P(x)$.

Question 31 – On veut déterminer le polynôme $P(x)$ pour lequel on aurait obtenu :

$$S_1 = 2, S_2 = -4, S_3 = 8 \text{ et } S_4 = 48.$$

On obtient :

- A) $P(x) = x^4 + 2x^3 + 4x^2 - x + 1$
- B) $P(x) = x^4 + x^3 - 4x^2 - 4x$
- C) $P(x) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x$
- D) $P(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 1$

II – Dans cette deuxième partie les résultats précédents vont être utilisés pour déterminer le polynôme caractéristique d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A = [a_{ij}]$ i et $j \in [1, n]$, en calculant les

puissances successives de A . On rappelle que la trace de A est définie par $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$. On note

$X_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ le polynôme caractéristique de A et par $\lambda_i \in \mathbb{C}$ l'ensemble des valeurs propres de

A . On définit cette fois les termes S_k par $S_k = \sum_{i=1}^n (\lambda_i)^k$, $k \in [1, n]$

✕ **Question 32** – Soit $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice triangulaire supérieure semblable à A , on a alors :

- A) $X_T(\lambda) = \prod_{i=1}^n (t_{ii} - \lambda)$
- B) $\text{Tr}(T^k) = (-1)^k \text{Tr} A^k$
- C) $S_k = \text{Tr}(A^k)$
- D) $X_T(\lambda)$ est toujours scindé dans $\mathbb{R}$

✕ **Question 33** – Soit $P(\lambda)$ le polynôme défini par $P(\lambda) = \det(\lambda I - A)$, on a :

- A) $P(\lambda) = X_A(\lambda) \quad \forall n$
- B) $P(\lambda) = (-1)^n X_A(\lambda) \quad \forall n$
- C) $P(\lambda_i) = 0 \quad \forall i \in [1, n]$
- D) $P(\lambda_i) \neq 0 \quad \forall i \in [1, n]$

On veut maintenant déterminer le polynôme caractéristique de la matrice $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

Question 34 - On obtient avec les notations précédentes :

- A) $S_3 = 8$ $S_4 = -16$
- B) $S_3 = -4$ $S_4 = 8$
- C) $S_3 = 8$ $S_4 = 48$
- D) $S_3 = -2$ $S_4 = 16$

Question 35 - Le polynôme caractéristique $X_B(\lambda)$ de B est alors :

- A) $\lambda^4 + 2\lambda^3 + 4\lambda^2 - 4\lambda + 1$
- B) $\lambda^4 + \lambda^3 - 4\lambda^2 - 4\lambda$
- C) $\lambda^4 - 2\lambda^3 + 4\lambda^2 - 8\lambda$
- D) $\lambda^4 - 2\lambda^3 - 4\lambda^2 + 1$

III - On suppose maintenant que pour tout $i \neq j$ alors $\lambda_i \neq \lambda_j$, i et $j \in [1, n]$ et on se propose de déterminer un vecteur propre X_i associé à un λ_i donné.

Pour cela on se donne un vecteur non nul $u_0 \in \mathbb{R}^n$ a priori arbitraire et on génère la suite de vecteurs u_k par la relation de récurrence $u_k = A \cdot u_{k-1}$, $k \in [1, n-1]$.

A chaque λ_i on associe (avec toujours $P(\lambda) = \det(\lambda I - A)$):

d'une part le polynôme $\phi_i(\lambda) = \frac{P(\lambda)}{\lambda - \lambda_i} = \lambda^{n-1} + (d_i)_1 \lambda^{n-2} + (d_i)_2 \lambda^{n-3} + \dots + (d_i)_{n-1}$ et d'autre part la

somme vectorielle : $Y_i = u_{n-1} + (d_i)_1 u_{n-2} + (d_i)_2 u_{n-3} + \dots + (d_i)_{n-1} u_0$

Question 36 - On peut alors dire :

- A) Les vecteurs X_i ne forment pas une base
- B) $\forall j \neq i$ alors X_j est orthogonal à X_i
- C) il existe une matrice diagonale D telle que $D = P^{-1}AP$
- D) La matrice D admet les mêmes vecteurs propres que A

Question 37 – On peut remarquer que :

- A) $\phi_i(\lambda_j) = P'(\lambda_j)$
- B) $\phi_i(\lambda_j) \neq 0$ pour $i \neq j$
- C) si $(d_i)_{n-1} = 0$ alors le coefficient a_n de $P(\lambda)$ est également nul
- D) si $(d_i)_{n-1} \neq 0$ alors le coefficient a_n de $P(\lambda)$ est également toujours $\neq 0$

Question 38 – On se propose d'écrire le vecteur u_0 sous la forme : $u_0 = \mu_1 X_1 + \mu_2 X_2 + \dots + \mu_n X_n$

- A) cette décomposition n'est pas unique
- B) cette décomposition peut ne pas exister
- C) on peut exprimer u_k en fonction des coefficients de u_0
- D) on ne peut pas exprimer u_k en fonction des coefficients de u_0

Question 39 – En calculant la somme vectorielle Y_i pour un λ_i donné on remarque que :

- A) Y_i est aussi un vecteur propre associé à λ_i si μ_i est non nul
- B) Y_i est un vecteur orthogonal à X_i
- C) si $\mu_i = 0$ alors u_0 est orthogonal à X_i
- D) si $\mu_i = 0$ alors u_0 n'est jamais orthogonal à X_i

Question 40 – Soit une matrice $C \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de polynôme caractéristique $X_C(\lambda) = -\lambda^3 - \lambda^2 + 10\lambda - 8$

dont l'une des racines est $\lambda = 1$. En partant de $u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ on obtient $u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $u_2 = \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}$

Un vecteur propre associé à la valeur propre de plus grand module est :

- A) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} -1 \\ 10 \\ -4 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 10 \\ -15 \\ 10 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 1 \\ -8 \\ 8 \end{pmatrix}$.