EXERCICES : DÉRIVABILITÉ, AVEC CORRIGÉS

Fonctions dérivables (ex. 1 à 6)

Exercice 1: (★)

Déterminer toutes les fonctions f dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x)f(y).$$

Solution:

$(f(0))^2 = f(0)$ donc $f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$. Si $f(0) = 0$ alors f est la fonction nulle.

Sinon, en dérivant par rapport à y puis en faisant $y = 0$ on obtient $f'(x) = af(x)$ avec $a = f'(0)$ d'où $f(x) = e^{ax}$ (réciproque immédiate).

Exercice 2: (★)

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable, telle que $f(a) = 0$. On suppose qu'il existe $k \geq 0$ tel que :

$$\forall x \in [a; b], |f'(x)| \leq k|f(x)|.$$

Montrer que $f = 0$.

Indication : on pourra considérer la fonction $g : x \mapsto (f(x))^2 e^{-2kx}$.

Solution:

f étant dérivable sur $[a; b]$ il en est de même de g , et

$$\forall x \in [a; b], g'(x) = 2f(x)(f'(x) - kf(x))e^{-2kx}.$$

Considérons, pour un $x \in [a; b]$, deux cas :

- si $f(x) \geq 0$, l'inégalité de l'énoncé devient $|f'(x)| \leq kf(x)$ donc en particulier $f'(x) - kf(x) \leq 0$ d'où $g'(x) \leq 0$;
- si $f(x) \leq 0$, l'inégalité de l'énoncé devient $|f'(x)| \leq -kf(x)$ soit $kf(x) \leq f'(x) \leq -kf(x)$ donc en particulier $f'(x) - kf(x) \geq 0$ d'où encore $g'(x) \leq 0$.

g' est donc toujours négative, donc g est décroissante; puisque $g(a) = 0$ on en déduit $g(x) \leq 0$ pour tout x , donc $(f(x))^2 \leq 0$ et finalement $f = 0$.

Exercice 3: (★★)

Trouver toutes les fonctions $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$, dérivables, telles que $f \circ f = f$.

Indication : si f n'est pas constante, soit $[a; b] = f([0; 1])$. Montrer que pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) = x$, puis en raisonnant par l'absurde, montrer que $a = 0$ et $b = 1$.

Solution:

Les fonctions constantes répondent bien sûr au problème.

Si f est une solution non constante, soit $[a; b] = f([0; 1])$ (avec $a < b$ puisque f non constante). Alors pour tout $x \in [a; b]$ il existe $y \in [0; 1]$ tel que $x = f(y)$ d'où $f(x) = f \circ f(y) = f(y) = x$.

Si jamais a était strictement positif, puisque a est un minimum de f atteint en un point intérieur, on a $f'(a) = 0$; mais puisque $f(x) = x$ sur $[a; b]$, on devrait avoir $f'_a(a) = 1$: contradiction.

Ainsi $a = 0$, et de la même façon, $b = 1$, d'où $f(x) = x$ sur $[0; 1]$.

En résumé, les solutions au problème sont les applications constantes et l'application $x \mapsto x$.

Exercice 4: ()**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable en 0, et telle que $f(0) = 0$. Déterminer :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} f\left(\frac{1}{k}\right).$$

Applications :

a) Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\sum_{k=1}^n e^{\frac{1}{n+k}} \right) - n \right)$.

b) Donner un équivalent quand n tend vers $+\infty$ de $\prod_{k=1}^n (n^2 + k)$.

Solution:

a) Le développement limité de f en 0 à l'ordre 1 s'écrit

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + o(x) = xf'(0) + x\varepsilon(x),$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. En posant $u_n = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)$ on aura donc

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2} f'(0) + \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2} \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{n^2} \underbrace{\sum_{k=0}^n k}_{=\frac{n(n+1)}{2}} + \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2} \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right)}_{=v_n}$$

avec

$$|v_n| \leq \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2} \left| \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right) \right| \leq \frac{\sum_{k=0}^n k}{n^2} \|\varepsilon\|_{\infty}^{[0; \frac{1}{n}]} = \frac{n+1}{2n} \|\varepsilon\|_{\infty}^{[0; \frac{1}{n}]}.$$

Puisque $\lim_0 \varepsilon = 0$ on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varepsilon\|_{\infty}^{[0; \frac{1}{n}]} = 0$ d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{f'(0)}{2}$.

b) – Un résultat préliminaire :

Posons $x_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ étant décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ on a pour tout $k \geq 2$:

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t},$$

d'où :

$$\forall k \geq 2, \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k} \leq \ln(k) - \ln(k-1).$$

(cette inégalité peut aussi s'obtenir à l'aide du théorème des accroissements finis). En additionnant ces inégalités pour $k \in [n; 2n]$ pour $n \geq 2$ on obtient après télescopage :

$$\ln(2n+1) - \ln(n) \leq x_n \leq \ln(2n) - \ln(n-1)$$

et d'après le théorème des gendarmes on en tire : $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \ln 2$ (résultat à retenir !)

– En posant $u_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}$ on aura, avec les mêmes notations que dans la question précédente :

$$u_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{f'(0)}{k} + \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} \varepsilon\left(\frac{1}{k}\right)$$

et par une technique similaire à celle de la question précédente et en utilisant les résultats préliminaires, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = f'(0) \ln 2$.

c) $\left(\sum_{k=1}^n e^{\frac{1}{n+k}} \right) - n = \sum_{k=1}^n (e^{\frac{1}{n+k}} - 1) = \sum_{k=n+1}^{2n} f\left(\frac{1}{k}\right)$ avec $f(x) = e^x - 1$.

On applique alors le résultat de la question b) (dont les hypothèses sont bien vérifiées) : la limite cherchée vaut $f'(0) \ln 2 = \ln 2$.

d) Posons $u_n = \prod_{k=1}^n (n^2 + k)$. Alors $u_n = n^{2n} v_n$ où $v_n = \prod_{k=0}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$.

On a alors $\ln(v_n) = \sum_{k=0}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$ donc en appliquant le résultat de la question a) à $f : x \mapsto \ln(1+x)$ on

obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(v_n) = \frac{f'(0)}{2} = \frac{1}{2}$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \sqrt{e}$ et enfin $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{e} n^{2n}$.

Exercice 5: (*)**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue en 0, telle que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(kx) - f(x)}{x} = \ell$, où k est un réel appartenant à $]0, 1[$.
 Montrer que f est dérivable en 0, et calculer $f'(0)$ en fonction de ℓ et k .
 Traiter le cas $k > 1$.

Solution:

L'hypothèse de l'énoncé peut aussi s'écrire :

$$f(kx) - f(x) = \ell x + x\varphi(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$. Soit donc $\varepsilon > 0$; il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $x \in [-\alpha; \alpha]$, $|\varphi(x)| < \varepsilon$ (définition de la limite).

En appliquant l'égalité précédente à $k^{i-1}x$, on a pour tout entier $i \in \mathbb{N}^*$: $f(k^i x) - f(k^{i-1}x) = \ell k^{i-1}x + k^{i-1}x\varphi(k^{i-1}x)$
 d'où en sommant, pour $n \in \mathbb{N}^*$, après télescopage :

$$f(k^n x) - f(x) = \left(\sum_{i=1}^n k^{i-1} \right) \ell x + \sum_{i=1}^n k^{i-1} x \varphi(k^{i-1}x).$$

Puisque $k \in]0; 1[$ la série $\sum_{i \in \mathbb{N}} k^i$ converge, et a pour somme $\frac{1}{1-k}$ donc :

$$f(k^n x) - f(x) - \frac{\ell x}{1-k} = \left(- \sum_{i=n+1}^{+\infty} k^{i-1} \right) \ell x + \sum_{i=1}^n k^{i-1} x \varphi(k^{i-1}x).$$

Soit maintenant $x \in [-\alpha; \alpha]$. Puisque $k < 1$ on a $k^i x \in [-\alpha; \alpha]$ pour tout entier i donc

$$\begin{aligned} \left| f(k^n x) - f(x) - \frac{\ell x}{1-k} \right| &\leq \left(\sum_{i=n+1}^{+\infty} k^{i-1} \right) |\ell x| + \sum_{i=1}^n k^{i-1} |x| |\varphi(k^{i-1}x)| \\ &\leq \frac{k^n}{1-k} |\ell x| + \varepsilon \sum_{i=1}^n k^{i-1} |x| \\ &\leq \frac{k^n}{1-k} |\ell x| + \varepsilon \sum_{i=1}^{+\infty} k^{i-1} |x| = \frac{k^n |\ell| + \varepsilon}{1-k} |x|. \end{aligned}$$

Puisque $k \in]0; 1[$ et que f est continue en 0, on peut trouver N tel que pour $n > N$ on ait

$$|f(k^n x) - f(0)| < \varepsilon |x| \quad \text{et} \quad k^n |x| < \varepsilon$$

ce qui conduit finalement, après utilisation de l'inégalité triangulaire, à :

$$\left| f(0) - f(x) - \frac{\ell x}{1-k} \right| \leq \left(\varepsilon + \frac{2\varepsilon}{1-k} \right) |x|$$

Ainsi, $f(x) - f(0) - \frac{\ell}{k-1}x = o(x)$, ce qui signifie que f est dérivable en 0, de dérivée $\frac{\ell}{k-1}$.

Si $k > 1$, faire la même chose avec x et $\frac{x}{k}$ au lieu de kx et x

Exercice 6: ()**

Soit $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{R})$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant

$$\forall t \in \mathbb{R}, M(t)^\top M(t) = I_n.$$

Montrer que, pour tout réel t , la matrice $M'(t)$ n'est pas inversible.

Solution:

D'après le cours, les applications $t \mapsto M(t)^\top$ puis $t \mapsto M(t)^\top M(t)$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ (théorèmes à citer précisément) et :

$$\forall t \in \mathbb{R}, (M^\top M)'(t) = M'(t)^\top M(t) + M(t)^\top M'(t) = 0.$$

Donc pour tout t , $M'(t)^\top M(t) - M^\top(t)M'(t)$ d'où en prenant le déterminant :

$$\det(M'(t)) \det(M(t)) = (-1)^{2n+1} \det(M(t)) \det(M'(t)) = -\det(M(t)) \det(M'(t)),$$

donc $\det(M(t)) \det(M'(t)) = 0$. Comme $M(t)$ est inversible (d'inverse $M(t)^T$) son déterminant est non nul d'où $\det(M'(t)) = 0$.

Dérivées successives (ex. 7 à 9)

Exercice 7: (★)

Calculer la dérivée n -ième en 0 de $f: x \mapsto \frac{1}{x^2 - 2x \cos \alpha + 1}$.

Solution:

Déjà on remarque que : $x^2 - 2x \cos \alpha + 1 = (x - e^{i\alpha})(x - e^{-i\alpha})$ (identité remarquable à connaître!).

• Si $\alpha = 0$ (modulo 2π) on a $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ donc f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et on a facilement par récurrence :

$$\forall x \neq 1, \forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n (n+1)!}{(x-1)^{n+2}}.$$

• Calcul similaire lorsque $\alpha = \pi$ modulo 2π ...

• Supposons donc désormais $\alpha \neq 0$ modulo π ; ainsi $e^{i\alpha} \neq e^{-i\alpha}$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle f s'écrit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{(x - e^{i\alpha})(x - e^{-i\alpha})} = \frac{\lambda}{x - e^{i\alpha}} + \frac{\mu}{x - e^{-i\alpha}}.$$

En multipliant cette relation par $x - e^{i\alpha}$ on trouve :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \frac{1}{x - e^{-i\alpha}} = \lambda + \mu \frac{x - e^{i\alpha}}{x - e^{-i\alpha}},$$

puis en prenant $x = e^{i\alpha}$ dans cette relation (il s'agit d'une égalité polynomiale vraie sur $\mathbb{R}$ donc aussi sur $\mathbb{C}$), on obtient :

$$\lambda = \frac{1}{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}} = \frac{1}{2i \sin \alpha} = -\frac{i}{2 \sin \alpha}.$$

De la même façon on trouve $\mu = \bar{\lambda}$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\lambda}{x - e^{i\alpha}} + \frac{\bar{\lambda}}{x - e^{-i\alpha}}$ d'où facilement par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = \lambda \frac{(-1)^n n!}{(x - e^{i\alpha})^{n+1}} + \bar{\lambda} \frac{(-1)^n n!}{(x - e^{-i\alpha})^{n+1}}.$$

En particulier :

$$f^{(n)}(0) = -n! \operatorname{Re} \left(\frac{\lambda}{e^{i(n+1)\alpha}} \right) = \frac{n! \sin(n+1)\alpha}{\sin \alpha}.$$

Exercice 8: (★★)

Montrer que, si $f_n(x) = x^{n-1} \ln(1+x)$ ($n \in \mathbb{N}^*$), alors : $f_n^{(n)}(x) = (n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+x)^k}$.

Solution:

On remarque déjà que, par les théorèmes usuels, f_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1; +\infty[$.

On procède par récurrence sur n pour montrer l'égalité.

- Pour $n = 1$, $f_1(x) = \ln(1+x)$ donc $f'(x) = \frac{1}{1+x}$ et l'égalité proposée est vérifiée.

- Supposons les résultat acquis à l'ordre n . On a alors, pour tout $x > -1$, $f_{n+1}(x) = x f_n(x)$ d'où en dérivant cette égalité à l'aide de la formule de Leibniz, puisque toutes les dérivées d'ordre ≥ 2 de $x \mapsto x$ sont nulles :

$$f_{n+1}^{(n+1)}(x) = x f_n^{(n+1)}(x) + (n+1) f_n^{(n)}(x)$$

et en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$f_{n+1}^{(n+1)}(x) = (n-1)! \left((n+1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+x)^k} - x \sum_{k=1}^n \frac{k}{(1+x)^{k+1}} \right).$$

En écrivant $x = (1+x) - 1$ (astuce à retenir!) :

$$\begin{aligned} f_{n+1}^{(n+1)}(x) &= (n-1)! \left((n+1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+x)^k} - \sum_{k=1}^n \frac{k}{(1+x)^k} + \sum_{k=1}^n \frac{k}{(1+x)^{k+1}} \right) \\ &= (n-1)! \left(\sum_{k=1}^n \frac{n+1-k}{(1+x)^k} + \sum_{k=1}^n \frac{k-1}{(1+x)^k} + \frac{n}{(1+x)^{n+1}} \right) \\ &= (n-1)! \sum_{k=1}^{n+1} \frac{n}{(1+x)^k} = n! \sum_{k=1}^1 \frac{n}{(1+x)^k}, \end{aligned}$$

ce qui est le résultat voulu à l'ordre $n+1$, et achève la récurrence.

Exercice 9: (**)

Soit $f(x) = e^{-x^2}$.

- a) Montrer que $f^{(n)}(x) = e^{-x^2} P_n(x)$, où P_n est un polynôme de degré n .
 b) En remarquant $f'(x) = -2xf(x)$, établir que :

$$\forall n \geq 1, P_{n+1}(x) = -2xP_n(x) - 2nP_{n-1}(x) \text{ et } P_n'(x) = -2nP_{n-1}(x).$$

- c) En déduire une équation différentielle du second ordre vérifiée par P_n , puis (***) une expression de P_n .

Solution:

On note déjà que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ comme composée de telles fonctions, donc toutes les dérivations qui vont suivre ne posent pas de problème.

- a) Récurrence facile :

- La propriété est vraie pour $n=0$, avec $P_0 = 1$;
- Si elle est vraie à l'ordre n on obtient alors en dérivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n+1)}(x) = (-2xP_n(x) + P_n'(x))e^{-x^2},$$

d'où la propriété à l'ordre $n+1$ en posant $P_{n+1}(x) = -2xP_n(x) + P_n'(x)$ (*): P_{n+1} est bien un polynôme de degré $n+1$, et cette relation de récurrence permet également de montrer que le coefficient dominant de P_n est égal à $(-2)^n$.

- b) La relation $f'(x) = -2xf(x)$ est immédiate; en la dérivant n fois à l'aide de la formule de Leibniz, on obtient, puisque toutes les dérivées d'ordre ≥ 2 de $x \mapsto x$ sont nulles :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, f^{(n+1)}(x) = -2xf^{(n)}(x) - 2nf^{(n-1)}(x)$$

d'où :

$$P_{n+1}(x) = -2xP_n(x) - 2nP_{n-1}(x).$$

C'est la relation demandée, et en combinant avec la relation (*) on en déduit $P_n'(x) = -2nP_{n-1}(x)$.

- c) • Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$. D'après la relation précédente on a : $P_n''(x) = -2nP_{n-1}'(x)$; la relation (*) écrite à l'ordre $n-1$ donne aussi : $P_n(x) = -2xP_{n-1}(x) + P_{n-1}'(x)$ donc

$$P_n''(x) = -2n(P_n(x) + 2xP_{n-1}(x)) = -2nP_n(x) + 2x(-2nP_{n-1}(x)) = -2nP_n(x) + 2xP_n'(x)$$

L'équation différentielle cherchée est donc :

$$P_n''(x) - 2xP_n'(x) + 2nP_n(x) = 0.$$

(cette relation est vraie a priori pour $n \geq 1$ compte tenu de la façon dont elle a été obtenue, mais elle reste vraie pour $n=0$ puisque $P_0 = 1$).

- On sait que P_n est un polynôme de degré n et de coefficient dominant $(-2)^n$; de plus, la relation de récurrence $P_{n+1}(x) = -2xP_n(x) + P_n'(x)$ ainsi que le calcul de $P_0 = 1$ et $P_1(x) = -2x$ permet de montrer facilement que P_n est de la parité de n .

On peut donc écrire : $P_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} a_{n-2k} x^{n-2k}$ avec $a_n = (-2)^n$. En « injectant » dans l'équation différentielle on obtient, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor - 1} (n-2k)(n-2k-1)a_{n-2k} x^{n-2k-2} - 2x \left(\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (n-2k)a_{n-2k} x^{n-2k-1} \right) + 2n \left(\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} a_{n-2k} x^{n-2k} \right) = 0$$

En regroupant les deux dernières sommes :

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor - 1} (n-2k)(n-2k-1)a_{n-2k}x^{n-2k-2} + \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-2(n-2k)a_{n-2k} + 2na_{n-2k})x^{n-2k} = 0.$$

En faisant maintenant un changement d'indice ($k' = k + 1$) dans la première somme :

$$\sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} (n-2k+2)(n-2k+1)a_{n-2k+2}x^{n-2k} + \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} 4ka_{n-2k}x^{n-2k} = 0.$$

Puisqu'un polynôme est nul pour tout x si et seulement si c'est le polynôme nul c'est-à-dire si et seulement si tous ses coefficients sont nuls, on en déduit :

$$\forall k \in \llbracket 1; \lfloor n/2 \rfloor \rrbracket, 4ka_{n-2k} + (n-2k+2)(n-2k+1)a_{n-2k+2} = 0.$$

La relation précédente s'écrit, pour $k = 1$:

$$a_{n-2} = -\frac{n(n-1)}{4}a_n,$$

puis pour $k = 2$:

$$a_{n-4} = -\frac{(n-2)(n-3)}{4 \cdot 2}a_{n-2} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4^2 \cdot 2 \cdot 1}a_n$$

puis pour $k = 3$:

$$a_{n-6} = -\frac{(n-4)(n-5)}{4 \cdot 3}a_{n-4} = -\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)}{4^3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}a_n$$

et l'on démontre alors par une récurrence élémentaire que :

$$\forall k \in \llbracket 1; \lfloor n/2 \rfloor \rrbracket, a_{n-2k} = (-1)^k \frac{n!}{4^k (n-2k)! k!} a_n \text{ avec } a_n = (-2)^n,$$

et finalement l'expression de P_n :

$$\forall x \in \mathbb{R}, P_n(x) = (-2)^n \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \frac{n!}{4^k (n-2k)! k!} x^{n-2k}.$$

Cette superbe formule a été vérifiée par le logiciel MAPLE pour $n \leq 5$...

Th. de Rolle. Th. des accroissements finis. Formule de Taylor-Young (ex. 10 à 19)

Exercice 10: Th. de Rolle généralisé (★)

Soit f continue sur $]a; +\infty[$, dérivable sur $]a; +\infty[$, telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ existe et est égale à $f(a)$.

Montrer qu'il existe $c \in]a; +\infty[$ tel que $f'(c) = 0$.

(Indication : considérer la fonction g définie sur $]0; \frac{\pi}{2}[$ par $g(x) = f(a + \tan x)$).

Solution:

g se prolonge en une fonction continue sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ et on lui applique le théorème de Rolle.

Exercice 11: (★)

En utilisant le théorème des accroissements finis, calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}})$.

Donnez une autre méthode pour calculer cette limite.

Solution:

On peut appliquer le théorème des accroissements finis à $f: x \mapsto e^{\frac{1}{x}}$ qui est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$, entre x et $x+1$:

$$\exists c_x \in]x; x+1[, e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}} = [x - (x+1)]f'(c_x) = \frac{1}{c_x^2} e^{\frac{1}{c_x}}.$$

Or $c_x \in]x; x+1[$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{c_x^2} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{c_x}} = 1$ donc la limite demandée est égale à 1.

Autre méthode : On peut écrire :

$$x^2 (e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}}) = x^2 e^{\frac{1}{x+1}} (e^{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}} - 1)$$

et puisque : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x+1}} = 1$, que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = 0$ et que $e^X - 1 \underset{X \rightarrow 0}{\sim} X$ on en déduit l'équivalent :

$$x^2 (e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}}) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = \frac{x}{x+1}$$

et on retrouve le résultat précédent.

Exercice 12: (★)

Soit f dérivable sur $]0;1[$ telle que : $f(0) = 0$ et $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in]0;1[$.

Montrer que f garde un signe constant sur $]0;1[$. (Rem : on ne suppose pas nécessairement f' continue).

Solution:

f étant dérivable sur $]0;1[$, elle y est continue; donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, si, par l'absurde, elle ne gardait pas un signe constant, il existerait x et y dans $]0;1[$ (0 est exclu) tels que $f(x) > 0$ et $f(y) < 0$ donc f s'annulerait en un certain point $c \in]0;1[$. Puisque $f(0) = f(c) = 0$, le théorème de Rolle donne alors l'existence de d tel que $f'(d) = 0$, c'est contradictoire.

Exercice 13: (★)

Soit f dérivable sur $\mathbb{R}_+$. On suppose f' croissante et on pose $g(x) = xf'(x) - f(x)$.

Montrer que g est croissante.

Solution:

Soient $x, y \in \mathbb{R}_+$ tels que $0 \leq x \leq y$. Alors :

$$g(y) - g(x) = yf'(y) - f(y) - xf'(x) + f(x) = x(f'(y) - f'(x)) + (y-x)f'(y) - f(y) + f(x).$$

Or d'après le théorème des accroissements finis il existe $c \in]x; y[$ tel que $f(y) - f(x) = (y-x)f'(c)$ donc :

$$g(y) - g(x) = x(f'(y) - f'(x)) + (y-x)(f'(y) - f'(c)).$$

f' étant croissante par hypothèse, on a $f'(y) - f'(x) \geq 0$ et $f'(y) - f'(c) \geq 0$, et on a aussi $x \geq 0$ et $y-x \geq 0$ donc $g(y) \geq g(x)$ c'est-à-dire g croissante.

Exercice 14: (★★)

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que, si P est scindé sur $\mathbb{R}$, il en est de même de P' .

Solution:

Soit P un polynôme scindé de $\mathbb{R}[X]$, de degré $n \geq 1$. On rappelle qu'un polynôme non constant est dit scindé dans $\mathbb{R}[X]$ si toutes ses racines sont réelles, ce qui équivaut à dire qu'il s'écrit sous la forme

$$P = \lambda \prod_{i=1}^p (X - a_i)^{\alpha_i}$$

les a_i étant les réels racines de P et les α_i leurs ordres de multiplicité.

Supposons les a_i rangés par ordre strictement croissants $a_1 < \dots < a_p$. On peut alors appliquer le théorème de Rolle à la fonction polynôme associée à P (cette fonction étant de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur chaque intervalle $[a_i; a_{i+1}]$, ce qui donne l'existence de $p-1$ racines distinctes de P' .

De plus, si a_i est une racine d'ordre α_i de P on a aussi que c'est aussi une racine d'ordre $\alpha_i - 1$ de P' (avec la convention qu'un réel est dit racine d'ordre 0 s'il n'est pas racine!). On a donc ainsi $\sum_{i=1}^p (\alpha_i - 1)$ racines de P' (comptées avec leur ordre de multiplicité).

On a donc trouvé

$$(p-1) + \sum_{i=1}^p (\alpha_i - 1) = (p-1) + \underbrace{\sum_{i=1}^p \alpha_i}_{=n \text{ car } P \text{ scindé}} - p = n-1$$

racines réelles de P' (comptées avec leur ordre de multiplicité), avec $\deg(P') = n-1$, donc P' est scindé dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 15: (★★★)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable, telle que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) = \ell \in \mathbb{R}$.

Montrer que : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{t} = \ell$. Réciproque ?

Solution:

Soit $\varepsilon > 0$ Par définition de la limite :

$$\exists A \in \mathbb{R} \text{ tq } \forall t \geq A, \ell - \varepsilon \leq f'(t) \leq \ell + \varepsilon.$$

Par le théorème des accroissements finis, pour tout $t > A$, il existe $c \in]A; t[$ tel que $f(t) - f(A) = (t - A)f'(c)$ donc, en utilisant l'encadrement précédent :

$$\forall t > A, \ell - \varepsilon \leq \frac{f(t) - f(A)}{t - A} \leq \ell + \varepsilon.$$

En écrivant alors $\frac{f(t)}{t} = \frac{f(t) - f(A)}{t} + \frac{f(A)}{t} = \frac{f(t) - f(A)}{t - A} \frac{t - A}{t} + \frac{f(A)}{t}$, on obtient :

$$\forall t > A, \frac{f(A)}{t} + (\ell - \varepsilon) \frac{t - A}{t} \leq \frac{f(t)}{t} \leq \frac{f(A)}{t} + (\ell + \varepsilon) \frac{t - A}{t}.$$

Or $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(A)}{t} + (\ell - \varepsilon) \frac{t - A}{t} \right) = \ell - \varepsilon$ donc pour t assez grand on aura $\frac{f(A)}{t} + (\ell - \varepsilon) \frac{t - A}{t} \geq \ell - 2\varepsilon$;

de même, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(A)}{t} + (\ell + \varepsilon) \frac{t - A}{t} \right) = \ell + \varepsilon$ donc pour t assez grand, on aura $\frac{f(A)}{t} + (\ell + \varepsilon) \frac{t - A}{t} \leq \ell + 2\varepsilon$.

Finalement, pour t assez grand on aura :

$$\ell - 2\varepsilon \leq \frac{f(t)}{t} \leq \ell + 2\varepsilon$$

de qui est exactement la définition de $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{t} = \ell$.

Rem : ce résultat n'admet pas de réciproque ; considérer par exemple la fonction $f : t \mapsto \sin t$.

Exercice 16: (★★★)

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$, telle que $\lim_{t \rightarrow +\infty} (f(t) + f'(t)) = \ell$.

Montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell$ (on pourra s'inspirer des méthodes de résolution d'une équation différentielle du premier ordre).

Solution:

Déjà, quitte à remplacer f par $f - \ell$, on peut se contenter de traiter le cas $\ell = 0$.

Posons $g(t) = f(t) + f'(t)$, et supposons donc que $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = 0$. En écrivant $f(t) = C(t)e^{-t}$ (méthode de variation de la constante), on obtient

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, f(t) = e^{-t} \int_0^t e^u g(u) du + Ce^{-t}$$

où C est une constante. Pour démontrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$, il suffit donc de montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} \int_0^t e^u g(u) du = 0$.

Soit donc $\varepsilon > 0$. Par définition de la limite :

$$\exists A > 0 \text{ tel que } \forall u \geq A, |g(u)| < \varepsilon.$$

Donc, pour $t > A$:

$$\begin{aligned} \left| e^{-t} \int_0^t e^u g(u) du \right| &= \left| e^{-t} \int_0^A e^u g(u) du + e^{-t} \int_A^t e^u g(u) du \right| \\ &\leq e^{-t} \int_0^A e^u |g(u)| du + e^{-t} \int_A^t e^u |g(u)| du \\ &\leq e^{-t} \int_0^A e^u |g(u)| du + \varepsilon e^{-t} \int_A^t e^u du \\ &\leq e^{-t} \int_0^A e^u |g(u)| du + \varepsilon e^{-t} (e^t - e^A) \leq e^{-t} \int_0^A e^u |g(u)| du + \varepsilon. \end{aligned}$$

D'autre part, A étant fixé, $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} \int_0^A e^u |g(u)| du = 0$ donc il existe $B > A$ tel que, pour $t > B$ on ait $e^{-t} \int_0^A e^u |g(u)| du < \varepsilon$.

Finalement, pour $t > B$ on a $\left| e^{-t} \int_0^t e^u g(u) du \right| < 2\varepsilon$, ce qui signifie, par définition de la limite, que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} \int_0^t e^u g(u) du = 0$, cqfd.

Exercice 17: Formule des trapèzes ()**

Soit f de classe $\mathcal{C}^3$ sur $[a; b]$, à valeurs réelles. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que :

$$f(b) = f(a) + \frac{b-a}{2} (f'(a) + f'(b)) - \frac{(b-a)^3}{12} f^{(3)}(c).$$

Indication : considérer la fonction $g: x \mapsto f(x) - f(a) - \frac{x-a}{2} (f'(a) + f'(x)) + \lambda \frac{(x-a)^3}{12}$, où λ est un réel bien choisi.

Solution:

On choisit λ tel que $g(\lambda) = 0$ (ce qui est possible car cela équivaut à une équation de la forme $\lambda \frac{(b-a)^3}{12} = \dots$ qui a bien une solution puisque $b-a \neq 0$).

Alors g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a; b]$, $g(a) = g(b) = 0$, puis en appliquant deux fois le théorème de Rolle on obtient l'existence de $c \in]a; b[$ tel que $g''(c) = 0$ ce qui après calculs donne le résultat.

Exercice 18: ()**

Soit f de classe $\mathcal{C}^5$ sur $[a; b]$, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que :

$$f(b) = f(a) + \frac{b-a}{2} (f'(a) + f'(b)) - \frac{(b-a)^2}{12} (f''(b) - f''(a)) + \frac{(b-a)^5}{720} f^{(5)}(c).$$

Solution:

Soit λ tel que

$$f(b) - f(a) - \frac{b-a}{2} (f'(a) + f'(b)) + \frac{(b-a)^2}{12} (f''(b) - f''(a)) = \lambda \frac{(b-a)^5}{720}$$

(λ existe puisque $b-a \neq 0$).

On considère alors la fonction

$$g: x \mapsto f(x) - f(a) - \frac{x-a}{2} (f'(x) + f'(a)) + \frac{(x-a)^2}{12} (f''(x) - f''(a)) - \lambda \frac{(x-a)^5}{720}.$$

g est dérivable sur $[a; b]$ et $g(a) = g(b) = 0$ (par le choix de λ) donc il existe $d \in]a; b[$ tel que $g'(d) = 0$. Or :

$$g'(x) = \frac{1}{2} (f'(x) - f'(a)) - \frac{x-a}{2} f''(x) + \frac{x-a}{6} (f''(x) - f''(a)) + \frac{(x-a)^2}{12} f'''(x) - \lambda \frac{(x-a)^4}{144}.$$

On constate que $g'(a) = 0 = g'(d)$, et puisque g' est dérivable on peut lui appliquer le théorème de Rolle : il existe $e \in]a; d[$ (donc $e \in]a; b[$) tel que $g''(e) = 0$. Or :

$$g''(x) = \frac{1}{6} (f''(x) - f''(a)) - \frac{x-a}{6} f'''(x) + \frac{(x-a)^2}{12} f^{(4)}(x) - \lambda \frac{(x-a)^3}{36}.$$

On constate que $g''(a) = 0 = g''(e)$, et puisque g'' est dérivable on peut lui appliquer le théorème de Rolle : il existe $c \in]a; e[$ (donc $c \in]a; b[$) tel que $g'''(c) = 0$. Or :

$$g'''(x) = \frac{(x-a)^2}{12} f^{(5)}(x) - \lambda \frac{(x-a)^2}{12}$$

don en écrivant $g'''(c) = 0$ et en divisant par $\frac{(c-a)^2}{12}$ (qui n'est pas nul!), on obtient $\lambda = f^{(5)}(c)$ d'où le résultat.

Exercice 19: ()**

Soient n réels $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ et f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a_1; a_n]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, telle que $f(a_i) = 0$ pour tout i .

Montrer que, pour tout $x \in [a_1; a_n]$, il existe $c \in]a_1; a_n[$ tel que :

$$f(x) = \frac{(x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n)}{n!} f^{(n)}(c).$$

Indication : considérer $g: t \mapsto f(t) - \lambda(t - a_1)(t - a_2) \dots (t - a_n)$ où λ est choisie telle que $g(x) = 0$ lorsque cela est possible.

Solution:

- Si x est égal à l'un des a_i le résultat est vrai en prenant c quelconque dans $]a_1; a_n[$ (tout est nul).
- Sinon, on peut poser

$$\lambda = \frac{f(x)}{(x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n)}$$

et on considère alors la fonction g définie sur $[a_1; a_n]$ par

$$g(t) = f(t) - \lambda(t - a_1)(t - a_2) \dots (t - a_n).$$

Alors g est de classe $\mathcal{C}^n$ et s'annule en $n + 1$ points distincts (les a_i et x). En appliquant alors le théorème de Rolle de façon itérée à g , puis g' puis g'' etc on obtient qu'il existe c tel que $g^{(n)}(c) = 0$.

Or la dérivée n -ième de la fonction polynôme de degré n $(x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n)$ est égale à $n!$ donc $g^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) - n!$ et l'égalité $g^{(n)}(c) = 0$ donne $\lambda = f^{(n)}(c)$, cqfd.

* * * *
* * *
* *
*