EXERCICES DE RÉVISIONS – ALGÈBRE

I. ALGÈBRE LINÉAIRE (sans réduction)

I.1. Sous-espaces vectoriels, familles de vecteurs, dimension

Exercice 1: X ESPCI 2015

Soit (v_1, v_2, v_3) une famille libre de vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Est-ce encore une famille libre si on voit les vecteurs dans $\mathbb{C}^3$?

Solution:

La réponse est oui. Soient en effet λ_1, λ_2 et $\lambda_3 \in \mathbb{C}$ tels que (1) : $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = (0, 0, 0)$. En conjuguant il vient (puisque les v_k sont réels) (2) : $\bar{\lambda}_1 v_1 + \bar{\lambda}_2 v_2 + \bar{\lambda}_3 v_3 = (0, 0, 0)$. La combinaison (1) + (2) donne

$$(\lambda_1 + \bar{\lambda}_1)v_1 + (\lambda_2 + \bar{\lambda}_2)v_2 + (\lambda_3 + \bar{\lambda}_3)v_3 = (0, 0, 0)$$

et, puisque les coefficients de cette combinaison linéaire sont réels et que la famille (v_1, v_2, v_3) est libre dans $\mathbb{R}^3$:

$$\lambda_1 + \bar{\lambda}_1 = \lambda_2 + \bar{\lambda}_2 = \lambda_3 + \bar{\lambda}_3 = 0$$

Par suite, $\forall k \in \{1, 2, 3\}$, $\operatorname{Re}(\lambda_k) = 0$. De même, la combinaison $-i(1) + i(2)$ donne $\forall k \in \{1, 2, 3\}$, $\operatorname{Im}(\lambda_k) = 0$.

Exercice 2: MINES-PONTS PC 2002

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ n réels distincts deux à deux, et de même pour $\beta_1, \dots, \beta_n$. Montrer que la famille $(f_{ij})_{ij}$ définie par $f_{ij}(x, y) = e^{\alpha_i x} e^{\beta_j y}$ est une famille libre de $\mathcal{A}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.

Solution:

On commence par démontrer le résultat classique :

Lemme : Soient $g_1, \dots, g_n$ des fonctions telles que $g_i = \underset{+\infty}{o}(g_{i+1})$ pour tout $i \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$. Alors la famille $(g_1, \dots, g_n)$ est libre.

(ce résultat se démontra aisément par récurrence sur n , en étudiant, si une combinaison linéaire est nulle, le comportement en $+\infty$).

Soit alors $(\lambda_{i,j})_{i,j}$ une famille de réels telle que $\sum_{i,j} \lambda_{i,j} f_{ij} = 0$ (*).

On choisit $\mu \in \mathbb{R}$ tel que la famille $(\alpha_i + \mu\beta_j)_{i,j}$ soit une famille de réels distincts. Pour montrer qu'un tel μ existe, il suffit de noter que la famille est composée de réels distincts si et seulement si μ n'est pas racine du polynôme

$$P(X) = \prod_{(i,j) \neq (i',j')} [(\alpha_i - \alpha_{i'}) + (\beta_i - \beta_{i'}) X],$$

qui est un polynôme non nul car produit de polynômes non nuls. On peut évidemment choisir de plein de manières différentes un μ qui ne soit pas racine du polynôme P .

Alors, on évalue l'équation (*) en tout $(x, \mu x)$, ce qui donne

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \sum_{i,j} \lambda_{i,j} e^{(\alpha_i + \mu\beta_j)x} = 0.$$

On conclut alors par le lemme.

Exercice 3: CENTRALE MP 2003

On considère la famille $\{X^n + X^{n+1}, n \in \mathbb{N}\}$. Est-elle libre ? Est-elle génératrice de $\mathbb{R}[X]$?

Solution:

Elle est clairement libre (polynômes de degrés distincts) mais non génératrice puisque X^k n'en est pas combinaison linéaire, et ce pour tout $k \in \mathbb{N}$!

Exercice 4: CCP PSI 2014

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{C}$.

- a) Montrer que si $(P_k)_{k \in \llbracket 0; n \rrbracket}$ est une base de $\mathbb{C}_n[X]$ alors $(P_k(X+a))_{k \in \llbracket 0; n \rrbracket}$ aussi.
- b) Soit $a \neq b$. Montrer que la famille $((X-a)^k(X-b)^{n-k})_{k \in \llbracket 0; n \rrbracket}$ est une base de $\mathbb{C}_n[X]$.

Solution:

- a) Il suffit de vérifier que la famille est libre, ce qui est immédiat en écrivant la définition.
- b) Il suffit de démontrer que la famille est libre. Écrire la définition, puis faire $X = a$ etc...

Exercice 5: MINES-PONTS PC 2017

Soient $(X_1, \dots, X_q)$ et $(Y_1, \dots, Y_p)$ deux familles libres d'éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$. Montrer que la famille $(Y_i^t X_j)_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q}$ est une famille libre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (on pourra d'abord traiter le cas $p = q = n$).

Solution:

Cas $p=q=n$

Dans ce cas, les deux familles sont des bases de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, que nous noterons respectivement $\mathcal{B}_X$ et $\mathcal{B}_Y$. Notons aussi $\mathcal{B}_c = (E_1, \dots, E_n)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, P la matrice de passage de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}_X$ (matrice dont les colonnes sont $X_1, \dots, X_n$) et Q celle de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}_Y$ (matrice dont les colonnes sont $Y_1, \dots, Y_n$).

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ on a $Y_i = PE_i$ et $X_j = QE_j$ d'où $Y_i^t X_j = PE_i^t E_j^t Q$. Mais $E_i^t E_j$ n'est autre que la matrice $E_{i,j}$ de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et ainsi $Y_i^t X_j = PE_{i,j}^t Q$.

Soit alors $(\lambda_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2}$ une famille de scalaires tels que $\sum_{i,j} \lambda_{i,j} Y_i^t X_j = 0$. D'après le calcul précédent, cela

donne $P \cdot \sum_{i,j} \lambda_{i,j} E_{i,j} \cdot {}^t Q = 0$. Or les matrices P et Q sont inversibles et donc $\sum_{i,j} \lambda_{i,j} E_{i,j} = 0$. Par liberté de la famille $(E_{i,j})$, on en déduit que tous les $\lambda_{i,j}$ sont nuls, d'où le résultat cherché.

Cas général

Par le théorème de la base incomplète, on peut trouver des vecteurs colonnes $X_{q+1}, \dots, X_n$ et $Y_{p+1}, \dots, Y_n$ tels que les deux familles $(X_1, \dots, X_n)$ et $(Y_1, \dots, Y_n)$ soient des bases de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$. Pour montrer que la famille $(Y_i^t X_j)_{(i,j) \in \llbracket 1; p \rrbracket \times \llbracket 1; q \rrbracket}$ est libre, il suffit de prouver que $(Y_i^t X_j)_{(i,j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2}$ est libre, et c'est ce qui a été fait ci-dessus. CQFD

Exercice 6: MINES-PONTS PSI 2018

Soient $a_0, \dots, a_n$ des scalaires 2 à 2 distincts et $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n .

Montrez que la famille $(P(X+a_k))_{0 \leq k \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Solution:

Il suffit de démontrer que la famille est libre. Supposons que $\sum_{i=0}^n \lambda_i P(X+a_i) = 0$. On écrit toutes les dérivées

successives en 0, et on obtient ainsi un système $MX = 0$ où M est la matrice de coefficients $P^{(j)}(a_i)$ pour $0 \leq i, j \leq n$ et $X = {}^t(\lambda_0 \ \lambda_1 \ \dots \ \lambda_n)$.

Il reste donc à prouver que M est inversible, c'est-à-dire que son déterminant est non nul.

Or la dernière colonne de cette matrice ne contient pas de 0 puisque P est exactement de degré n donc on peut retrancher un multiple de C_n aux autres colonnes pour enlever les constantes, puis un multiple de C_{n-1} aux précédentes pour enlever les a_j etc... de sorte qu'à la fin il reste un déterminant de VDM avec une constante multiplicative non nulle dans chaque colonne; les a_j étant distincts, ce déterminant est non nul.

Exercice 7: MINES-PONTS PSI 2017

Soit $(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$. Déterminer le rang de la famille (f_1, f_2, f_3) dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, où f_i est la fonction $x \mapsto \cos(x+a_i)$.

Solution:

Pour tout $i \in \{1, 2, 3\}$, f_i s'écrit $f_i = \cos a_i \cos - \sin a_i \sin$ donc $f_1, f_2, f_3 \in \text{Vect}(\cos, \sin)$, ce qui donne

$$\text{rg}(f_1, f_2, f_3) \leq 2.$$

Et le rang vaut exactement 2, sauf si f_1, f_2, f_3 sont proportionnelles, donc égales, ce qui implique en particulier que ces trois fonctions s'annulent aux mêmes points, c'est-à-dire que a_1, a_2 et a_3 sont congrus modulo 2π . Réciproquement si cette condition est vérifiée alors $f_1 = f_2 = f_3$ et le rang vaut bien 1.

Exercice 8: MINES-PONTS PSI 2016 2017

Montrer que les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$:

$$x \mapsto \cos x, x \mapsto \sin x, x \mapsto \cos(2x), x \mapsto \sin(2x), \dots, x \mapsto \cos(nx), x \mapsto \sin(nx)$$

sont linéairement indépendantes.

Solution:

On raisonne par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $n = 1$, il s'agit de montrer que la famille $(\sin, \cos)$ est libre : en effet, si λ et μ sont des réels tels que $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda \sin(x) + \mu \cos(x) = 0$, la substitution de x par zéro donne $\mu = 0$, puis $\lambda = 0$ car la fonction sinus n'est pas la fonction nulle.

On suppose que la propriété est établie au rang $n - 1$ avec $n \geq 2$. Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{R}^{2n}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cos(ix) + \mu_i \sin(ix) = 0$. En dérivant deux fois, on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) + n^2 f(x) = 0 = \sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{(n^2 - k^2)}_{\neq 0} (\lambda_k \cos(kx) + \mu_k \sin(kx))$$

et on conclut grâce à l'hypothèse de récurrence que $\lambda_k = \mu_k = 0$ pour tout $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$. Il reste alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \lambda_n \cos(nx) + \mu_n \sin(nx) = 0$, et on conclut comme à l'initialisation.

Exercice 9: CCP PC 2005

On pose $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \text{ tq } P(1) = P(2) = P(3) = 0\}$ et $G = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \text{ tq } P(0) = 0\}$. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_3[X]$.

Solution:

Utiliser $F \cap G = \{0\}$ puis les dimensions, puisque F étant l'ensemble des multiples de $(X-1)(X-2)(X-3)$ dans $\mathbb{R}_3[X]$ est de dimension 1 et G ensemble des multiples de X est de dimension 3.

Exercice 10: MINES-PONTS PSI 2013, CCP PSI 2014, CENTRALE PSI 2015, ...

Montrer que si deux sous-espaces vectoriels admettent un supplémentaire commun, ils sont isomorphes. Étudier la réciproque.

Solution:

Si $E = F \oplus G = F' \oplus G$ considérer la projection sur F parallèlement à G . D'après le théorème d'isomorphisme, elle induit un isomorphisme de F' sur F .

La réciproque est vraie en dimension finie (exercice classique, procéder par récurrence), mais pas en dimension infinie. Exemple : considérer $E = \mathbb{R}[X]$ et $F = \{P \in E \text{ tq } P(0) = 0\}$. Alors E est isomorphe à F par $X \mapsto XP$ mais...

I.2. Applications linéaires**Exercice 11: CCP PSI 2017**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E . On suppose que, pour tout vecteur x de E , x et $f(x)$ sont colinéaires.

Montrer que : $\exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, f(x) = \lambda x$.

Solution:

L'hypothèse fait que $\forall x \in E \setminus \{0_E\}, \exists \lambda_x \in \mathbb{K}, f(x) = \lambda_x x$, et ce λ_x est unique pour $x \neq 0_E$. Il s'agit de montrer que $\forall x, y \in E \setminus \{0_E\}, \lambda_x = \lambda_y$.

- Si (x, y) est libre : $f(x+y) = \lambda_{x+y}(x+y) = f(x) + f(y) = \lambda_x x + \lambda_y y$ et, par liberté de (x, y) , $\lambda_{x+y} = \lambda_x = \lambda_y$.

- Si (x, y) est liée, $\exists \alpha \in \mathbb{K}$, $y = \alpha x$. Alors $f(y) = \lambda_y y = \alpha f(x) = \alpha \lambda_x x = \lambda_x y$ et comme $y \neq 0_E$, $\lambda_x = \lambda_y$.
Si λ est la valeur constante de $x \mapsto \lambda_x$, on a donc $\forall x \in E \setminus \{0\}$, $u(x) = \lambda x$, et cette égalité reste vraie pour $x = 0_E$, donc u est une homothétie.

Exercice 12: CCP PSI 2018

Soit $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}[X])$ défini par $\varphi(P) = P(X+1) + P(X-1) - 2P(X)$.

- Comparez le degré de P avec celui de $\varphi(P)$.
- Déterminez le noyau de φ .
- Étudiez la surjectivité de φ .

Solution:

- si $\deg(P) \leq 1$, $\varphi(P) = 0$. Sinon, si $\deg(P) = n$, on écrit $P = a_n X^n + \dots$ avec $a_n \neq 0$, et on vérifie facilement que $\deg \varphi(P) \leq n$ puis que les termes en X^n et X^{n-1} s'éliminent mais que le terme en X^{n-2} n'est pas nul. Donc $\deg(\varphi(P)) = \deg(P) - 2$.
- si $\deg(P) \geq 2$, $\varphi(P) \neq 0$. Ainsi $\text{Ker } \varphi = \mathbb{R}_1[X]$.
- Soit $Q \in \mathbb{R}[X] \neq 0$, de degré n . Si $\varphi(P) = Q$, $\deg(P) = \deg(Q) + 2 = n + 2$. On considère alors l'endomorphisme ψ induit par φ sur $\mathbb{R}_{n+2}[X]$. $\text{Im}(\psi) \subset \mathbb{R}_n[X]$ et le théorème du rang donne l'égalité donc ψ surjective de $\mathbb{R}_{n+2}[X]$ sur $\mathbb{R}_n[X]$ donc tout $Q \in \mathbb{R}_n[X]$ a un antécédent par ψ donc par φ et φ est surjective.

Exercice 13: MINES-PONTS PC 2013

Soient E, F, G trois espaces vectoriels de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $w \in \mathcal{L}(E, G)$.

Montrer : $\text{Ker } u \subset \text{Ker } w \iff \exists v \in \mathcal{L}(F, G), v \circ u = w$.

Solution:

On raisonne par double implication.

- Supposons qu'il existe $v \in \mathcal{L}(F, G)$ tel que $v \circ u = w$. Alors, si $x \in \text{Ker } u$, on a $w(x) = v(u(x)) = v(0) = 0$, donc $x \in \text{Ker } w$.
- Réciproquement, supposons que $\text{Ker } u \subset \text{Ker } w$. Soit H un supplémentaire dans F de l'image de u (on sait que H existe car F est de dimension finie). Soit $x \in F$ s'écrivant $x = y + z$ avec $y = u(t) \in \text{Im } u$ et $z \in H$. Montrons que $w(t)$ ne dépend pas du vecteur t choisi dans E tel que $u(t) = y$: si on a aussi $u(t') = y$, alors $u(t - t') = y - y = 0$, donc $t - t' \in \text{Ker } u$, donc $t - t' \in \text{Ker } w$ donc $w(t) = w(t')$. Il est alors légitime de poser

$$v(x) = w(t).$$

Par construction, on a $v \circ u = w$, et la vérification de la linéarité de v n'est qu'une formalité.

Exercice 14: X ESPCI PC 2012

Soient E, F et G trois espaces vectoriels de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

Montrer que $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg } u$ si et seulement si $\text{Im } u \cap \text{Ker } v = \{0\}$.

Solution:

On pose $w = v|_{\text{Im } u}$, et on note que

$$\begin{aligned} \text{Im } w &= \text{Im } v \circ u \\ \text{Ker } w &= \text{Im } u \cap \text{Ker } v. \end{aligned}$$

- La première égalité se prouve ainsi : si $z \in G$, il appartient à $\text{Im } w$ si et seulement s'il existe $y \in \text{Im } u$ (l'ensemble de départ de w) tel que $z = w(y) = v(y)$, c'est-à-dire si et seulement s'il existe $x \in E$ (l'ensemble de départ de u) tel que $z = v(u(x))$, ou encore si et seulement si $z \in \text{Im } v \circ u$.
- La deuxième égalité se prouve ainsi : $\text{Ker } w$ est l'ensemble des vecteurs $y \in \text{Im } u$ tels que $w(y) = v(y) = 0$, c'est-à-dire tels que $y \in \text{Ker } v$.

On déduit de la première égalité que $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg } u$ si et seulement si le rang de w est égal à la dimension de l'espace de départ de w , qui est $\text{Im } u$. Or la formule du rang affirme que $\text{rg } w = \dim \text{Im } w$ si et seulement si $\dim \text{Ker } w = 0$. Comme $\text{Ker } w = \text{Im } u \cap \text{Ker } v$, la démonstration est terminée.

Exercice 15: CCP PSI 2013

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E .
 Montrer que si $\text{Im } f = \text{Im } f^2$ alors $E = \text{Ker } f + \text{Im } f$. Étudier la réciproque.
 Que peut-on dire de plus si E est de dimension finie ?

Solution:

Si $\text{Im } f = \text{Im } f^2$ pour tout $x \in E$ on a $f(x) \in \text{Im } f^2$ donc il existe y tel que $f(x) = f^2(y)$. On écrit alors $x = (x - f(y)) + f(y)$.

Réciproquement si $E = \text{Ker } f + \text{Im } f$ alors si $y \in \text{Im } f$ on écrit $y = f(x)$ avec $x = x_1 + x_2$ etc.. donc $\text{Im } f \subset \text{Im } f^2$, et l'inclusion inverse est toujours vraie.

En dimension finie, la somme est de plus directe d'après le théorème du rang.

Exercice 16: CCP MP 2010

Soient f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel E sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ vérifiant $f \circ g = \text{Id}$.

- Montrer que $\text{Ker}(g \circ f) = \text{Ker } f$ et $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im } g$.
- Montrer que $E = \text{Ker } f \oplus \text{Im } g$.
- Dans quel cas peut-on conclure $g = f^{-1}$?
- Calculer $(g \circ f) \circ (g \circ f)$ et caractériser $g \circ f$

Solution:

- a) $\text{Ker } f \subset \text{Ker}(g \circ f)$ et $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$.

Pour $x \in \text{Ker}(g \circ f)$, on a $f(x) = f(g(f(x))) = f(0) = 0$ donc $x \in \text{Ker } f$.

Pour $y \in \text{Im } g$, il existe $x \in E$ tel que $y = g(x)$ et alors $y = g(f(g(x))) = g(f(x)) \in \text{Im}(g \circ f)$.

- b) Si $x \in \text{Ker } f \cap \text{Im } g$ alors on peut écrire $x = g(a)$ et puisque $f(x) = 0$, $a = f(g(a)) = 0$ donc $x = 0$.

Pour $x \in E$, on peut écrire $x = (x - g(f(x))) + g(f(x))$ avec $x - g(f(x)) \in \text{Ker } f$ et $g(f(x)) \in \text{Im } g$.

- c) Si f est inversible alors $f \circ g = \text{Id}$ entraîne $g = f^{-1}$.

Cette condition suffisante est aussi évidemment nécessaire.

- d) $(g \circ f) \circ (g \circ f) = g \circ (f \circ g) \circ f = g \circ f$ et donc $g \circ f$ est un projecteur.

Exercice 17: CCP MP 2004

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = 0$ et $u + v$ est inversible.

Montrer que $n = \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$.

Solution:

- Une remarque utile : on a toujours $\text{Im}(u + v) \subset \text{Im } u + \text{Im } v$. En effet, si $y \in \text{Im}(u + v)$, il existe x tel que $y = (u + v)(x)$ d'où $y = u(x) + v(x) \in \text{Im } u + \text{Im } v$.

- Ici, $u + v$ est inversible donc $\text{Im}(u + v) = E$ donc $E \subset \text{Im } u + \text{Im } v$ ce qui implique $E = \text{Im } u + \text{Im } v$. Donc $n = \dim E = \text{rg } u + \text{rg } v - \dim(\text{Im } u \cap \text{Im } v)$ d'après la formule de Grassmann, d'où $n \leq \text{rg } u + \text{rg } v$.

- Enfin, $u \circ v = 0$ implique $\text{Im } v \subset \text{Ker } u$ donc $\text{rg } v \leq \dim(\text{Ker } u)$ soit $\text{rg } v \leq n - \text{rg } u$ ce qui donne l'autre inégalité $\text{rg } u + \text{rg } v \leq n$.

Exercice 18: CCP 2003, 2005

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \geq 2$. Soit f un projecteur de E . Trouver une condition nécessaire et suffisante sur $t \in \mathbb{K}$ pour que $f + t\text{Id}$ soit inversible. Trouver alors son inverse.

Solution:

Il faut que $t \notin \text{Sp}(f)$ donc $t \notin \{0, -1\}$ dans le cas où f n'est pas un projecteur trivial.

On cherche bien sûr g^{-1} sous la forme $\mu f + \lambda \text{Id}$ et donc, en injectant, on obtient

$$(f + t\text{Id})^{-1} = \frac{1}{t} \left(\text{Id} - \frac{1}{t+1} f \right).$$

Exercice 19: classique

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que f est un projecteur si et seulement si $\operatorname{rg} f + \operatorname{rg}(\operatorname{Id} - f) = n$.

Solution:

Si f est un projecteur, c'est évident.

On suppose $\operatorname{rg}(\operatorname{Id} - f) + \operatorname{rg} f = n$. Le théorème du rang donne $\dim \operatorname{Ker}(\operatorname{Id} - f) = \dim \operatorname{Im} f$. Mais comme $\operatorname{Ker}(\operatorname{Id} - f)$ est l'espace propre associé à 1, $\operatorname{Ker}(\operatorname{Id} - f) \subset \operatorname{Im} f$ donc il y a égalité donc $(\operatorname{Id} - f) \circ f = 0$ et f est un projecteur.

Exercice 20: classique

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ f = f$, $g \circ g = g$ et $f \circ g = g \circ f$. On pose $h = f + g - g \circ f$. Déterminer $\operatorname{Ker} h$ et $\operatorname{Im} h$.

Solution:

- On commence par noter que h est un projecteur par calcul direct.
- Soit $x \in \operatorname{Ker} h$, alors $f(x) + g(x) - gf(x) = 0$ donc, en composant par f , on a $f^2(x) + fg(x) - fgf(x) = 0$ soit en simplifiant $f(x) = 0$. De même, en composant par g , on trouve $g(x) = 0$. Donc $\operatorname{Ker} h \subset \operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Ker} g$.
- Soit $x \in \operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Ker} g$, alors clairement $h(x) = 0$. Donc $\operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Ker} g \subset \operatorname{Ker} h$.
En conclusion : $\operatorname{Ker} h = \operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Ker} g$.
- Soit $x \in \operatorname{Im} h$. Alors $x = f(y) + g(y) + g(f(y)) = f(y) + g(y + f(y))$ ce qui montre que x appartient à $\operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g$. Donc $\operatorname{Im} h \subset \operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g$.
- Soit $x \in \operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g$. Alors il existe donc $y \in \operatorname{Im} f$ et $z \in \operatorname{Im} g$ tels que $x = y + z$, et de plus $f(y) = y$ et $g(z) = z$. Alors $h(x) = \dots = x$ donc $x \in \operatorname{Im} h$. Donc $\operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g \subset \operatorname{Im} h$.
En conclusion : $\operatorname{Im} h = \operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g$.

Exercice 21: MINES-PONTS PC 2000

Soi $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^n = \operatorname{Id}_E$. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u et p un projecteur sur F . Posons : $q = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u^k \circ p \circ u^{n-k}$.

- a) Montrer que $u \circ q = q \circ u$.
- b) Montrer que $q \circ p = p$.
- c) En déduire q est un projecteur.

Solution:

- a) Réorganiser un peu les termes.
- b) Utiliser la stabilité de F par u : $p \circ u^{n-k} \circ p = u^{n-k} \circ p$.
- c) Immédiat.

Exercice 22: MINES-PONTS PSI 2018

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- a) Montrez que si u est un projecteur, alors $\operatorname{rg}(u) = \operatorname{tr}(u)$. La réciproque est-elle vraie?
- b) On suppose qu'il existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^m = \operatorname{Id}_E$ et on pose $p = \frac{1}{m}(\operatorname{Id}_E + u + \dots + u^{m-1})$.
Justifiez que p est un projecteur puis montrez que $\frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} \operatorname{tr}(u^k) = \dim \operatorname{Ker}(u - \operatorname{Id}_E)$.

Solution:

- a) Question de cours. Réciproque fautive pour $n \geq 2$: Ex : $\operatorname{diag}(-1, 3, 0, 0, \dots, 0)$.
- b) $p \circ u = p$ puis $p \circ u^k = p$ puis $p \circ p = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} p = p$, donc p projecteur.
 $\frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} \operatorname{tr}(u^k) = \operatorname{tr}(p) = \operatorname{rg}(p) = \dim \operatorname{Ker}(p - \operatorname{Id}_E)$. Montrons que $\operatorname{Ker}(p - \operatorname{Id}_E) = \operatorname{Ker}(u - \operatorname{Id}_E)$.

- L'inclusion $\text{Ker}(u - \text{Id}_E) \subset \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$ est facile car $u(x) = x \implies u^k(x) = x$ pour tout k donc $p(x) = x$.
- L'autre inclusion est tout aussi facile car $p(x) = x \implies x = \frac{1}{m}(x + u(x) + \dots + u^{m-1}(x)) \implies u(x) = x$.

Exercice 23: MINES-PONTS PC 2002

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n . Soient $p_1, \dots, p_n$ des projecteurs des E tels que : $p_1 + \dots + p_n = \text{Id}_E$. Montrer que :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2 \quad p_i \circ p_j = \delta_{ij} p_j.$$

Solution:

Il suffit de montrer la formule pour $i \neq j$. On commence par noter que $\text{Id} = p_1 + \dots + p_n$ est un projecteur. Donc $n = \text{rg Id} = \text{tr Id} = \sum \text{tr } p_i = \sum \text{rg } p_i$.

Or $E = \text{Id}(E) \subset \sum p_i(E)$ donc $E = \sum_{i=1}^n p_i(E)$; puisque $\dim E = n = \sum \dim p_i(E)$ d'après ce qui précède, la somme est directe : $E = \bigoplus_{i=1}^n p_i(E)$.

Soit alors $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

Soit $x \in \text{Im } p_i$. Alors $x = p_i(x)$ mais on peut aussi décomposer $x = \text{Id}_E(x) = \sum_{j=1}^n p_j(x)$. Par unicité de la

décomposition, on a nécessairement $p_j(x) = 0$ pour tout $j \neq i$.

Cela montre que $p_j \circ p_i = 0$ pour tout $j \neq i$.

Exercice 24: CCP MP 2003

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

a) Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v - v \circ u = u$. Montrer que;

$$\forall p \in \mathbb{N} \quad u^p v - v u^p = p u^p.$$

En utilisant $\phi : \begin{cases} \mathcal{L}(E) & \longrightarrow & \mathcal{L}(E) \\ w & \longmapsto & wv - vw \end{cases}$, montrer que u est nilpotent.

b) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, exprimer $\text{tr}(u^k)$ en fonction des valeurs propres non-nulles de u et de leur ordre de multiplicité.

c) Montrer que, si $\text{tr}(u^k) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, alors u est nilpotent. Retrouver ainsi le résultat du a).

Solution:

a) Récurrence. Si u non nilpotent, tous les u^k sont vecteurs propres de ϕ avec la valeur propre k , or $\text{Sp}(\phi)$ est fini.

b) classique : on trigonalise u et on obtient $\text{tr } u^k = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \lambda^k = \sum_{i=1}^p m_i \lambda_i^k$ en notant λ_i les valeurs propres non nulles et m_i leur ordre de multiplicité ($1 \leq i \leq p$).

c) Les relations $\sum_{i=1}^p m_i \lambda_i^k = 0$ pour $0 \leq k \leq p-1$ forment un système de Vandermonde de déterminant non nul ayant une solution $(m_1, \dots, m_p)$ non nulle, c'est impossible, donc la seule valeur propre de u est 0. On en déduit que $\chi_u = X^n$ puis u nilpotent d'après C.H.

I.3. Matrices

Exercice 25: X PSI 2021

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrez que l'on peut écrire : $M = \sum_{k=0}^{n-1} D_k C^k$

avec D_k diagonales et $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$.

Solution:

Le calcul des C^k est classique : les « 1 » se décalent, à justifier proprement en considérant l'endomorphisme canoniquement associé.

Puisque multiplier une matrice M à gauche par $\text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ revient à multiplier sa i -ème ligne par d_i , il suffit de prendre $D_0 = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$, $D_1 = \text{diag}(a_{12}, a_{23}, \dots, a_{n1})$, $\dots$, $D_{n-1} = \text{diag}(a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{n,n-1})$.

Exercice 26: CCP PSI 2007, 2014, 2018

Soient A et B deux matrices carrées réelles d'ordre n . On suppose qu'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que P soit de degré non nul, et vérifie $P(0) = 1$ et $AB = P(A)$. Établir que A est inversible et en déduire que A et B commutent.

Solution:

$P = XQ + 1$ donne $AB = P(A) = AQ(A) + I_n$ donc $A(B - Q(A)) = I_n$ ce qui implique A inversible à droite donc inversible, d'inverse $B - Q(A)$.

On a donc aussi $(B - Q(A))A = I_n$ donc $BA = I_n + Q(A)A = I + AQ(A) = P(A) = AB$.

Exercice 27: CCP MP 2010

Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie $n \geq 2$.

- Indiquer des endomorphismes de E dont la représentation matricielle est la même dans toutes les bases de E .
- Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Montrer que pour tout $i \in \{2, \dots, n\}$, la famille $(e_1 + e_i, e_2, \dots, e_n)$ est une base de E .
- Déterminer tous les endomorphismes de E dont la représentation matricielle est diagonale dans toutes les bases de E .
- Quels sont les endomorphismes de E dont la représentation matricielle est la même dans toutes les bases de E ?

Solution:

a) Les endomorphismes λId_E ont la propriété voulue.

b) Les familles $(e_1, \dots, e_n)$ et $(e_1 + e_i, e_2, \dots, e_n)$ engendrent le même espace vectoriel. Étant toutes deux formées de n vecteurs, si l'une est libre, l'autre aussi.
(on peut aussi écrire la matrice de la famille dans la base et il est facile de voir que cette matrice est inversible).

c) Soit u un endomorphisme de E dont la matrice est diagonale dans toutes les bases de E .

La matrice de u dans la base $(e_1, \dots, e_n)$ est de la forme $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

Puisque la matrice de u dans la base $(e_1 + e_i, e_2, \dots, e_n)$ est aussi diagonale, il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que

$$u(e_1 + e_i) = \alpha(e_1 + e_i).$$

Or par linéarité

$$u(e_1 + e_i) = u(e_1) + u(e_i) = \lambda_1 e_1 + \lambda_i e_i$$

Par liberté de la famille (e_1, e_i) on identifie les scalaires et on peut affirmer

$$\lambda_1 = \alpha = \lambda_i$$

Ainsi, si un endomorphisme a une représentation matricielle diagonale dans toutes les bases de E , sa matrice est de la forme λI_n et donc cet endomorphisme est de la forme λId_E .

- d) Soit u un tel endomorphisme. Si $A = (a_{i,j})$ est sa matrice dans une base $(e_1, \dots, e_n)$ alors sa matrice dans la base $(e_1, 2e_2, \dots, ne_n)$ a pour coefficient général

$$\frac{j}{i} a_{i,j}$$

et comme cette matrice doit être égale à la précédente, on obtient

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j \Rightarrow a_{i,j} = 0$$

Ainsi, cet endomorphisme a une matrice diagonale dans toute base de E et en vertu de ce qui précède, il est de la forme λId_E avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Exercice 28: CCP PC 2000

Calculer l'inverse de la matrice $A = (a_{ij})_{ij}$ avec $a_{ii} = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ et $a_{i,i+1} = -a$ pour tout $i \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$.

Solution:

On a $A = \begin{pmatrix} 1 & -a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -a \\ & & & 1 \end{pmatrix}$. On pose $A = I - aJ$, avec J nilpotente, donc

$$(I - aJ)(I + aJ + a^2J^2 + \dots + a^{n-1}J^{n-1}) = I.$$

Exercice 29: CCP 2016

On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique $\mathcal{B}$. On note P le plan d'équation $x + y + z = 0$ et D la droite d'équations $x = \frac{y}{3} = \frac{z}{2}$, et p la projection sur P parallèlement à D .

1. Montrer que $P \oplus D = \mathbb{R}^3$.
2. Soit u un vecteur de $\mathbb{R}^3$ de coordonnées (x, y, z) dans $\mathcal{B}$. Calculer $p(u)$ et déterminer la matrice de p dans $\mathcal{B}$.

Solution:

1. Directement, P est un plan (noyau de la forme linéaire $(x, y, z) \mapsto x + y + z$, cf cours) et D est la droite de base $(1, 3, 2)$. Puisque D n'est pas incluse dans P (car $(1, 3, 2)$ ne vérifie pas l'équation de P), P et D sont supplémentaires (cf cours sur les hyperplans).
2. Classique et fait en classe : on écrit simplement $p(u) = (x', y', z') \in P$, c'est-à-dire $x' + y' + z' = 0$ et $p(u) - u \in D$ c'est-à-dire qu'il existe λ tel que $p(u) - u = \lambda(1, 2, 3) \dots$:

$$\text{On doit trouver (sauf erreur de calcul..) : } \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

On peut vérifier $M^2 = M$ et aussi $\text{tr}(M) = \dim(P)$ (le rang d'un projecteur est égal à sa trace).

Exercice 30:

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle qu'il existe $\lambda > 0$ avec $A^3 = -\lambda A$.
Montrer que le rang de A est pair.

Solution:

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à A . Montrons que $\mathbb{R}^n = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u$. Pour cela, d'après le th. du rang, il suffit de montrer que $\text{Im } u \cap \text{Ker } u = \{0\}$. Soit donc $y \in \text{Im } u \cap \text{Ker } u$; $u(y) = 0$ et $y = u(z)$ donc $u^3(z) = u^2(y) = 0$ mais aussi $u^3(z) = -\lambda u(z)$ d'où $u(z) = y = 0$.
Soit alors v l'endomorphisme induit par u sur $\text{Im } u$; d'après un th. célèbre, v est un automorphisme de $\text{Im } u$. On a également, si $y = u(x) \in \text{Im } u$, $u^2(y) = u^3(x) = -\lambda u(x) = -\lambda y$, donc $v^2 = -\lambda \text{Id}_{\text{Im } u}$. D'où $(\det v)^2 = \det(v^2) = (-\lambda)^r$ où $r = \text{rg } u = \dim \text{Im } u$. On en déduit $(-\lambda)^r > 0$ et r est pair.

Exercice 31: CCP PSI 2018

Soit u un endomorphisme non nul de $\mathbb{R}^3$ tel que $u^3 = \text{Id}$ et $u \neq \text{Id}$.

- a) Montrez que 1 est valeur propre de u .
 b) Montrez que $\text{Ker}(u - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(u^2 + u + \text{Id}) = \mathbb{R}^3$.

- c) Montrez qu'il existe une base dans laquelle la matrice de u est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Solution:

- a) $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(u) \subset \{1\}$ et dimension impaire donc au moins une valeur propre réelle.
- b) $\text{Ker}(u - \text{Id}) \cap \text{Ker}(u^2 + u + \text{Id}) = \{0\}$ est facile, donc la somme est directe. Pour démontrer que cette somme est égale à $\mathbb{R}^3$, deux méthodes :
- On écrit : $3 = (X^2 + X + 1) - (X + 2)(X - 1)$ donc pour tout $x \in \mathbb{R}^3$, $x = \frac{1}{3}(u^2 + u + \text{Id})(x) - \frac{1}{3}((u + 2\text{Id}) \circ (u - \text{Id}))(x)$ avec $\frac{1}{3}(u^2 + u + \text{Id})(x) \in \text{Ker}(u - \text{Id})$ et idem pour l'autre.
 - Analyse-synthèse : $x = y + z$ avec $y, z \in \dots \implies u(x) = y + u(z) \implies u^2(x) = y + u^2(z) \implies y = \frac{1}{3}(x + u(x) + u^2(x))$ et $z = x - y$.
- c) on prend $e_1 \notin \text{Ker}(u - \text{Id}) \cup \text{Ker}(u^2 + u + \text{Id})$, $e_2 = u(e_1)$, $e_3 = u(e_2)$. On vérifie (e_1, e_2, e_3) libre :
 En effet, $e_1 = x + y$ avec $(x, y) \in \text{Ker}(u - \text{Id}) \times \text{Ker}(u^2 + u + \text{Id})$ et x, y non nuls. On ne peut pas avoir $u(y) = \lambda y$ puisque cela impliquerait λ valeur propre donc $\lambda = 1$ et $y \in \text{Ker}(u - \text{Id})$! Donc la famille $(y, u(y))$ est libre dans $\text{Ker}(u^2 + u + \text{Id})$ (qui est donc forcément de dimension 2), et la famille $(x, y, u(y))$ est par concaténation une base de $\mathbb{R}^3$. Puisque $u(e_1) = u(x) + u(y) = x + u(y)$ et $u^2(e_1) = x + u^2(y) = x - y - u(y)$, la matrice de la famille (e_1, e_2, e_3) dans cette base est $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ inversible, cqfd.
- Conclusion : (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$, et dans cette base la matrice de u a la forme voulue.

Exercice 32: CCINP PSI 2021

1. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{2n})$ tel que $u^2 = 0$ et $\text{rg } u = n$.

- a) Montrez $\text{Ker } u = \text{Im } u$.

- b) En déduire il existe une base de $\mathbb{R}^{2n}$ dans laquelle la matrice de u est $\begin{bmatrix} 0 & I_n \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

2. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{3n})$ tel que $u^3 = 0$ et $\text{rg } u = 2n$.

- a) Montrez $\text{Ker } u = \text{Im } u^2$.

- b) En déduire il existe une base de $\mathbb{R}^{3n}$ dans laquelle la matrice de u est $\begin{bmatrix} 0 & I_n & 0 \\ 0 & 0 & I_n \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Solution:

1. a) On a facilement $\text{Im } u \subset \text{Ker } u$ puisque $u^2 = 0$, et le théorème du rang permet d'avoir l'égalité des dimensions.
- b) Soit F un supplémentaire de $\text{Ker } u$: $F \oplus \text{Ker } u = \mathbb{R}^{2n}$. On sait que u est un isomorphisme de F sur $\text{Im } u$ donc si l'on considère une base $(f_1, \dots, f_n)$ de F et si l'on pose $e_i = u(f_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de $\text{Im } u = \text{Ker } u$ puis $(e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n)$ est une base de $\mathbb{R}^{2n}$ dans laquelle la matrice de u est de la forme voulue.
2. a) $\text{Im } u^2 \subset \text{Ker } u$ découle facilement de l'hypothèse $u^3 = 0$.
 On voudrait calculer la dimension de $\text{Im } u^2$; cela se fait par une méthode classique (voir d'autres exercices de cette feuille) : on considère la restriction u' de u à $\text{Im } u$ et on lui applique le théorème du rang :

$$\dim(\text{Im } u) = \dim(\text{Im } u') + \dim(\text{Ker } u') = \dim(\text{Im } u^2) + \dim(\text{Ker } u \cap \text{Im } u)$$

donc $\dim(\text{Im } u^2) = \text{rg } u - \dim(\text{Ker } u \cap \text{Im } u) \geq 2n - n = n$ et finalement on obtient bien $\text{Im } u^2 = \text{Ker } u$.

(et on déduit aussi du calcul précédent $\dim(\text{Ker } u \cap \text{Im } u) = n = \dim(\text{Ker } u)$ donc $\text{Ker } u \cap \text{Im } u = \text{Ker } u$ c'est-à-dire $\text{Ker } u \subset \text{Im } u$.)

- b) Soit S un supplémentaire de $\text{Im } u$; $\dim S = n$; et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de S .
 Montrons que la famille $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n, u(e_1), \dots, u(e_n), u^2(e_1), \dots, u^2(e_n))$ est libre :

Si on a $\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i + \sum_{i=1}^n \beta_i u(e_i) + \sum_{i=1}^n \gamma_i u^2(e_i) = 0$, alors, en appliquant u^2 à cette égalité, on obtient, puisque $u^3 = 0$:

$$u^2 \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right) = 0 \quad \text{i.e.} \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \in \text{Ker } u^2$$

Donc $\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \in \text{Im } u$; or $\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \in S$, donc $\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0$ d'où $\alpha_i = 0$ pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

On a donc $\sum_{i=1}^n \beta_i u(e_i) + \sum_{i=1}^n \gamma_i u^2(e_i) = 0$, puis, en appliquant u , on en déduit de la même façon que les β_i sont nuls, et ensuite que les γ_i sont nuls.

Finalement, $\mathcal{B} = (u^2(e_1), \dots, u^2(e_n), u(e_1), \dots, u(e_n), e_1, \dots, e_n)$ (dans cet ordre) est une base de E , et il est facile de vérifier que la matrice de u dans cette base est bien de la forme voulue.

Exercice 33: CCP PSI 2016

Soit E un espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base $\mathcal{B}$ et f l'endomorphisme de E dont la

matrice dans la base $\mathcal{B}$ est : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -3 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $E = \text{Ker}(f^2) \oplus \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E)$.

2. Donner un élément de $\text{Ker}(f^2) \setminus \text{Ker } f$.

3. Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}'$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Solution:

a) - Déjà, $\text{Ker } f^2 \cap \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E) = \{0\}$ car $f^2(x) = 0$ et $f(x) = 2x$ impliquent $x = 0$.

- Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. En résolvant le système $AX = 2X$ on trouve $x = y$ et $z = 0$ donc $\text{Ker}(f - 2\text{Id}_E)$ est la droite vectorielle engendrée par le vecteur $e'_3 = (1, 1, 0)$.

$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ donc $\text{rg } A^2 = 1$ d'où $\dim \text{Ker } f^2 = 2$.

- Cela prouve que les deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires.

b) Le calcul ci-dessus montre que $\text{Ker } f^2$ est le plan d'équation $x + y - z = 0$. Le vecteur $e'_2 = (1, -1, 0)$ (au hasard!) appartient donc bien à $\text{Ker } f^2$ et il est facile de vérifier qu'il n'appartient pas à $\text{Ker } f$ puisque

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

c) en posant $e'_1 = f(e'_2) = (0, -4, -4)$, la famille $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ convient (vérification facile).

Exercice 34: CCP PSI 2018

On se donne une matrice $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall i \geq 2, a_{i,1} = 1, \forall i \leq n-1, a_{i,n} = 1$ et des 0 ailleurs.

a) Donnez le rang de A puis le rang de A^2 .

b) Montrez que $\text{Ker } A$ et $\text{Im } A$ sont supplémentaires.

c) Montrez que A est semblable à $A' = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$ avec $B \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$.

d) Calculez $\text{tr}(B)$ et $\text{tr}(B^2)$. Donnez le spectre de A . A est-elle diagonalisable?

Solution:

a) $\text{rg}(A) = 2$. On a $Ae_1 = e_2 + \dots + e_n = u$ et $Ae_n = e_1 + \dots + e_{n-1} = v$ puis $A(u) = v$ et $A(v) = u$. La matrice A^2 est A avec les colonnes C_1 et C_n inversées. $\text{rg}(A^2) = 2$.

- b) $\text{Im } A = \text{Im } A^2$ donc $\text{Ker } A \oplus \text{Im } A = \mathbb{R}^n$ (résultat classique). Sinon, plus classiquement, on peut vérifier directement $\text{Ker } A \cap \text{Im } A = \{0\}$ + théorème du rang, ou bien utiliser $\text{Ker } A = \text{Vect}(e_2, \dots, e_{n-1})$ et $\text{Im } A = \text{Vect}(u, v)$.
- c) On prend la base $(e_2, \dots, e_{n-1}, u, v)$. $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
- d) trivial

Exercice 35: CCP PSI 2010 2011 2013 2017 2018

Déterminer les $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $M^t M M = I_n$.

Solution:

$$M^t M M = I_n \implies {}^t M M^t M M = {}^t M.$$

$$\text{Mais aussi en transposant } M^t M M = I_n \implies {}^t M M^t M = I_n \implies {}^t M M^t M M = M.$$

Donc $M = {}^t M$: M est symétrique, puis vérifie $M^3 = I_n$ donc $\text{Sp}(M) \subset \{1\}$. Étant diagonalisable on en déduit $M = I_n$.

Exercice 36:

- a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que A est de rang ≤ 1 si et seulement si il existe $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$ telles que $A = CL$.
En déduire une relation entre A et A^2 lorsque $\text{rg } A \leq 1$.
- b) Caractériser les matrices $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $A^2 = A$.
- c) Caractériser les matrices $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $A^2 = 0$.

Solution:

- a) – Supposons $\text{rg } A \leq 1$; si $\text{rg } A = 0$ il suffit de prendre $C = L = 0$ et c'est fini. Sinon A possède une colonne non nulle, disons la j -ème, que l'on notera C_j , et toutes les autres colonnes lui sont proportionnelles : $C_k = a_k C_j$ pour $k \neq j$. En posant $L = (a_1, \dots, a_{j-1}, 1, a_{j+1}, \dots, a_n)$ on a bien $A = C_j L$.
– Réciproquement, si $A = CL$ toutes les colonnes de A sont proportionnelles à C donc $\text{rg } A \leq 1$.
- b) On classe les matrices concernées selon leur rang.
Si $\text{rg } A = 0$, $A = 0$.
Si $\text{rg } A = 2$ alors A est inversible et en multipliant l'égalité proposée par A^{-1} on obtient $A = I_2$.
Sinon, il existe C colonne et L ligne, non nulles, telles que $A = CL$. La relation $A^2 = A$ s'écrit alors $CLCL = CL$ et puisque LC est un réel, elle équivaut à $LC = 1$. Donc $A = CL$ avec $LC = 1$.
- c) Si $A^2 = 0$ alors $\text{Im } A \subset \text{Ker } A$. Il n'y a donc que deux cas possibles (compte tenu du th. du rang, $\dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A = 3$) :
– Soit $\text{Ker } A = \mathbb{R}^3$, donc $A = 0$.
– Soit $\dim \text{Ker } A = 2$ et alors $\text{rg } A = 1$. Donc il existe C colonne et L ligne, non nulles, telles que $A = CL$. La relation $A^2 = 0$ s'écrit alors $CLCL = 0$ et puisque LC est un réel, elle équivaut à $LC = 0$. Donc $A = CL$ avec $LC = 0$.

Exercice 37:

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Déterminer le rang de A et calculer son inverse si elle existe.

Solution:

Déjà $\text{rg } A \geq n - 1$ puisque l'on peut en extraire une matrice inversible d'ordre $n - 1$ (le bloc en haut à droite par exemple).
De plus si n est pair la combinaison $C_1 - C_2 + C_3 - \dots - C_n$ donne une colonne nulle, donc les colonnes sont linéairement dépendantes et A est de rang $n - 1$.
Supposons donc n impair. Posons $J = A - I_n$. J est la matrice de l'endomorphisme $e_1 \rightarrow e_n, e_2 \rightarrow e_1, e_3 \rightarrow e_2, \dots, e_n \rightarrow e_{n-1}$ (matrice de permutation), donc $J^n = I_n$.

On calcule : $(I_n + J)(I_n - J + J^2 - \dots + (-1)^{n-1}J^{n-1}) = I_n + (-1)^{n-1}J^n = (1 + (-1)^{n-1})I_n$ donc pour n impair on aura $A(I_n - J + J^2 - \dots + J^{n-1}) = 2I_n$ ce qui prouve que A est inversible et que son inverse est

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(I_n - J + J^2 - \dots + J^{n-1}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & \dots & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & \ddots & \ddots & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -1 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 & 1 \\ 1 & -1 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & \dots & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 38: CENTRALE PC 2001

- On suppose A inversible. Calculer $\begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B & -A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix}$. On suppose que A et B commutent ; montrer que $\det \begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix} = \det(AD - BC)$.
- Étendre ce résultat au cas où A n'est pas inversible.

Solution:

- Un calcul par blocs donne :

$$\begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B & -A \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & A^{-1}C \\ -BA + AB & -BC + AD \end{bmatrix}$$

On obtient le résultat en prenant le déterminant des deux membres, puisque $\det \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B & -A \end{bmatrix} = \det A \cdot \det(A^{-1}) = 1$ etc...

- Si A n'est pas inversible, il existe une infinité de scalaires λ tels que la matrice $A_\lambda = A - \lambda I$ soit inversible (il faut et il suffit que $\lambda \notin \text{Sp } A$). A_λ commute avec B , on peut donc lui appliquer le résultat précédent : $\det \begin{bmatrix} A_\lambda & C \\ B & D \end{bmatrix} = \det(A_\lambda D - BC)$. Le déterminant d'une matrice étant une fonction polynomiale en les coefficients, on obtient donc ici une égalité de deux polynômes en λ , valable pour une infinité de valeurs de λ , donc aussi pour $\lambda = 0$.

Exercice 39: CCP MP 2002

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrer que $D_n = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 \cos \alpha & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 \cos \alpha & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos(n\alpha)$.

Solution:

Par récurrence. Le résultat est vrai pour $n = 1, 2$. Pour $n \geq 2$, en développant par rapport à la dernière colonne, il vient $D_{n+1} = 2 \cos \alpha D_n - D_{n-1}$, les formules de trigonométrie font le reste.

Exercice 40: MINES-PONTS PC 2017

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Ces matrices sont-elles semblables sur $\mathbb{C}$? Le sont-elles sur $\mathbb{R}$?

Solution:

Notons $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est A .

Alors $f(e_1) = e_1 + 3e_2 + 2e_3$, $f(e_2) = 2e_1 + e_2 + 3e_3$ et $f(e_3) = 3e_1 + 2e_2 + e_3$.

La famille (e_3, e_2, e_1) est aussi une base de $\mathbb{R}^3$, notée $\mathcal{B}'$.

Alors la matrice de f dans la base $\mathcal{B}'$ est $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

A et B sont donc les matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes.

Ainsi A et B sont semblables sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$.

Exercice 41: TPE PSI 2013, MINES-PONTS PSI 2010, etc...

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que A et B sont aussi semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution:

On écrit $A = P^{-1}BP$ avec $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$. Donc $PA = BP$. On note $P = R + iJ$, avec $R, J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et on montre aisément que $RA = BR$ et $JA = BJ$. On définit $\psi : \lambda \mapsto \det(R + \lambda J)$, alors ψ est un polynôme non nul (car $R + iJ$ est inversible donc $\psi(i) \neq 0$); il existe donc λ_0 réel tel que $\psi(\lambda_0) \neq 0$ (car si ψ polynôme était nul sur $\mathbb{R}$ il serait identiquement nul) soit $R + \lambda_0 J$ inversible.

On note alors $P_0 = R + \lambda_0 J$ et on vérifie que $P_0 A = B P_0$ donc $A = P_0^{-1} B P_0$, ce qui permet de conclure.

Exercice 42: ENSEA PSI 2021

Trouvez toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Solution:

Notons J la matrice de l'énoncé.

Si A est solution, alors nécessairement A commute avec J ; on pose $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ puis on écrit $AJ = JA$,

on trouve $g = h = d = 0$ et $i = a$ puis $A^2 = J$ conduit à $a = e = 0$ et $f = \frac{1}{b}$ avec $b \neq 0$ donc $A = \begin{pmatrix} 0 & b & c \\ 0 & 0 & \frac{1}{b} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

avec c quelconque et $b \neq 0$.

Exercice 43: TPE MP 2002

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $\alpha > 0$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Discuter de l'existence de $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que

$$\alpha X + (\text{tr } X)A = B.$$

Solution:

En prenant la trace de cette équation, on trouve

$$(\alpha + \text{tr } A) \text{tr } X = \text{tr } B.$$

– Si $\text{tr } B \neq 0$ et que $\alpha = -\text{tr } A$, alors l'équation n'admet aucune solution.

– Si $\alpha \neq -\text{tr } A$, alors $\text{tr } X = \frac{\text{tr } B}{\alpha + \text{tr } A}$ donc on peut écrire

$$X = \frac{1}{\alpha} \left[B - \frac{\text{tr } B}{\alpha + \text{tr } A} A \right].$$

– Si $\text{tr } B = 0$ et $\alpha = -\text{tr } A$, alors $X = \alpha^{-1}B$ convient manifestement. De plus, si Y vérifie la même équation, alors $Z = X - Y$ vérifie $\alpha Z = (\text{tr } Z)A$ donc Z est proportionnel à A .

En prenant $Y = \alpha^{-1}B + \lambda A$, on s'aperçoit que cette solution marche tout le temps. Ainsi, les solutions sont les $\alpha^{-1}B + \lambda A$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.

II. RÉDUCTION

Exercice 44: IMT PSI 2018

Montrez que si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifie $M^3 + M^2 + M = 0$, alors $\text{tr}(M) \in \mathbb{Z}$.

Solution:

M annule le polynôme $X(X^2 + X + 1)$ scindé à racines simples dans $\mathbb{C}$ donc M diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\text{Sp}(M) \subset \{1, j, j^2\}$. De plus χ_M est à coefficients réels donc la multiplicité p de j est la même que celle de j^2 . En notant $q = n - 2p$ la multiplicité de 0 , on a $\text{tr}(M) = q \times 0 + p(j + j^2) = -p$, cqfd.

Exercice 45: CENTRALE PSI 2018

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que $P = (X + 3)(X^2 + X + 1)$ est annulateur de A . Montrez $\text{tr}(A) < 0$.

Solution:

P est scindé à racines simples dans $\mathbb{C}$ donc on diagonalise dans $\mathbb{C}$. A étant à coefficients réels les deux valeurs propres complexes (éventuelles) j et j^2 ont même ordre de multiplicité m' donc $\text{tr} A = -3m + m'(j + j^2) = -3m - m' < 0$.

Exercice 46: CCP PSI 2013

Soit $A \in \mathcal{M}_5(\mathbb{R})$ inversible telle que $A^3 - 3A^2 + 2A = 0$ et $\text{tr} A = 6$.
Déterminer le polynôme caractéristique de A .

Solution:

A est diagonalisable car annule le polynôme scindé simple $X(X - 1)(X - 2)$. $\text{Sp}(A) \subset \{0, 1, 2\}$ mais 0 est exclu car A inversible.

Si 1 est la seule valeur propre, $A = I_5$: ne convient pas ; si 2 est la seule valeur propre, $A = 2I_5$: ne convient pas.

Donc $\text{Sp}(A) = \{1, 2\}$ et $\Pi_A = (X - 1)(X - 2)$. Si l'on veut $\text{tr} A = 6$ il faut 1 valeur propre d'ordre 4 et 2 simple d'où $\chi_A = -(X - 1)^4(X - 2)$.

Exercice 47: NAVALE PSI 2016

Soit M une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que M est semblable à $2M$.
Montrer que M est nilpotente.

Solution:

Si λ est valeur propre de M alors 2λ l'est aussi et par récurrence $2^k\lambda$ l'est aussi pour tout $k \in \mathbb{N}$. La seule valeur propre de M est donc 0 . Il ne reste alors plus qu'à trigonaliser (ou utiliser Cayley-Hamilton).

Exercice 48: TPE PSI 2016

Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est limite d'une suite de matrices diagonalisables.

Solution:

En trigonalisant (possible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$), on est ramené à démontrer le résultat pour une matrice triangulaire supérieure (en utilisant aussi la continuité de l'application $M \mapsto P^{-1}MP$, linéaire en dimension finie.)

Si T est triangulaire sup, on pose alors $T_p = T + \text{diag}(1/p, 2/p, \dots, n/p)$. Alors à partir d'un certain rang les termes diagonaux de T_p sont tous distincts donc T_p est diagonalisable et $\lim_{p \rightarrow +\infty} T_p = T$, cqfd.

Exercice 49: TPE MP 2001

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence

$$\chi_A(B) \in \text{GL}_n(\mathbb{C}) \iff \text{Sp } A \cap \text{Sp } B = \emptyset.$$

Peut-on généraliser à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

Solution:

Il suffit d'écrire que χ_A est scindé : $\chi_A = \prod (X - \lambda_i)$,

$$\chi_A(B) \in \text{GL}_n(\mathbb{C}) \iff (B - \lambda_i I_n) \in \text{GL}_n(\mathbb{C}) \text{ pour } i = 1, \dots, n \iff \text{Sp } A \cap \text{Sp } B = \emptyset.$$

En prenant les matrices réelles $A = B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, on voit que $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \text{Sp}_{\mathbb{R}}(B) = \emptyset$ mais $\chi_A(B) = 0$ par Cayley-Hamilton, donc on ne peut pas généraliser !

Exercice 50: CCP PC 2001

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$. Soit $b \in \mathbb{C}$ tel que $(f - b\text{Id})^3 = 0$. On suppose que f n'est pas une homothétie.

a) Montrer que f n'est pas diagonalisable.

b) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer l'équivalence

$$(P(f) \in \text{GL}(\mathbb{C}^n)) \iff (P(b) \neq 0).$$

Solution:

a) Si f était diagonalisable, en écrivant sa matrice dans une base propre on aurait $f = b\text{Id}$.

b) L'endomorphisme f n'admet que b comme valeur propre : $\text{Sp}(f) = \{b\}$. On trigonalise f dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et c'est fini.

Ou bien : on scinde P dans $\mathbb{C}$: $P(f) = (f - \alpha_1 \text{Id}) \circ \dots \circ (f - \alpha_n \text{Id})$. Alors

$$P(f) \text{ injectif ou surjectif} \iff \text{chaque produit est injectif/surjectif} \iff \alpha_i \notin \text{Sp}(f) \text{ pour tout } i \in \llbracket 1; n \rrbracket \iff P(b) \neq 0.$$

Exercice 51: CCP PSI 2019 2021

Soit $X \neq 0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $A = X^t X$.

- Déterminez le rang et le spectre de A .
- Calculez le polynôme caractéristique de A .
- Montrez l'égalité : $\det(I_n + A) = 1 + {}^t X X$.

Solution:

1. En notant $X = {}^t(x_1 \dots x_n)$, A est la matrice par blocs $\begin{bmatrix} x_1 X & x_2 X & \dots & x_n X \end{bmatrix}$ donc $\text{rg } A = 1$ (car $X \neq 0$).
Donc $\text{Ker } A$ est de dimension $n - 1$: 0 est donc valeur propre d'ordre $\geq n - 1$. L'autre valeur propre est donc $\text{tr } A = \sum x_i^2 = {}^t X X$.

2. Comme on en connaît les racines on a directement : $\chi_A(\lambda) = \lambda^{n-1} (\lambda - {}^t X X)$.

3. $\det(I_n + A) = (-1)^n \det(-I_n - A) = (-1)^n \chi_A(-1) = (-1)^n (-1)^{n-1} (-1 - {}^t X X) = 1 + {}^t X X$.

Exercice 52: CCP PSI 2013 2016

Montrer que $g : P \mapsto n^2 X P(X) - (X^2 + X) P'(X) - X^3 P''(X)$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
Est-il diagonalisable ? injectif ?

Solution:

g linéaire est facile.

Si $\deg P < n$ alors $\deg g(P) \leq n$ et si $\deg P = n$ l'examen du terme dominant montre que l'on a $\deg g(P) \leq n$ encore. Donc g est bien un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

Posons $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. La résolution de $g(P) = \lambda P$ amène à

$$\forall k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket, (n^2 - k^2) a_k = (\lambda + k + 1) a_{k+1} \text{ et } 0 = \lambda a_0.$$

Pour $\lambda = 0$ on trouve une droite de solution (on exprime les a_p en fonction de a_0). Pour $\lambda + k + 1 \neq 0$ on trouve tous les coefficients nuls donc $P = 0$.

Donc nécessairement il existe $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$ tel que $\lambda = -(k+1)$. Pour cette valeur, on obtient $a_0 = \dots = a_k = 0$ et a_p en fonction de a_{k+1} pour $p \geq k+1$ donc encore une droite de solutions.

Conclusion : les valeurs propres de g sont les nombres $-n, \dots, -1, 0$; g est donc diagonalisable et puisque 0 est valeur propre il n'est pas injectif.

Exercice 53: IMT PSI 2016

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et s une symétrie vectorielle. Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose $\varphi(u) = \frac{1}{2}(s \circ u + u \circ s)$.

- Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.
- Donner un polynôme annulateur de φ .
- φ est-il diagonalisable? Préciser les éléments propres de φ .

Solution:

| Corrigé en classe

Exercice 54: CCP PSI 2010 2014 2015 2017 2018

Soit $\psi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto \text{Tr}(M)I_n + M$.

- Montrer que ψ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
- Trouver $\text{Ker}(\psi)$ et $\text{rg}(\psi)$.
- Trouver un polynôme annulateur de ψ .
- L'application ψ est-elle bijective? Si oui, trouver ψ^{-1} .
- Trouver les éléments propres de ψ .

Solution:

- $\psi(M)$ est évidemment une matrice et $\forall \lambda, M, N, \psi(\lambda M + N) = \text{Tr}(\lambda M + N)I_n + \lambda M + N = \lambda \psi(M) + \psi(N)$.
C'est donc un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
- On résout $\psi(M) = 0$ soit $\text{Tr}(M)I_n + M$. Donc $M = -\text{Tr}(M)I_n$.
Si on applique de nouveau la trace, on obtient $\text{Tr}(M) = -n\text{Tr}(M)$. Comme n est un entier, $\text{Tr}(M) = 0$ et $M = 0$ grâce à la relation précédente.
 ψ est donc injective. D'après le théorème du rang, $\text{rg}(\psi) = n^2$.
- $\psi^2(M) = \text{Tr}(\psi(M))I_n + \psi(M) = \text{Tr}(\text{Tr}(M)I_n + M)I_n + \text{Tr}(M)I_n + M = (n+2)\text{Tr}(M)I_n + M = (n+2)\psi(M) - (n+1)M$
Finalement $\psi^2 = (n+2)\psi - (n+1)I_d$
- Comme le rang est égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée, ψ est surjective donc bijective.
En utilisant le polynôme annulateur, on compose par $\psi^{-1} : \psi = (n+2)I_d - (n+1)\psi^{-1}$.
Ainsi $\psi^{-1}(M) = \frac{1}{n+1}((n+2)M - \text{Tr}(M)I_n - M) = M - \frac{\text{Tr}(M)}{n+1}I_n$
- $\text{Tr}(M)I_n + M = \lambda M$ soit $(\lambda - 1)M = \text{Tr}(M)I_n$.
Soit $\lambda = 1$ et $\text{Tr}(M) = 0$. On obtient donc un sous-espace propre de dimension $n^2 - 1$.
Soit $\lambda = n+1$ en appliquant la trace sur l'égalité et $M = I_n$ est un vecteur propre associé.

Exercice 55: CCP PSI 2017 2018

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ non nulle. On définit $\varphi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \text{tr}(AM)I_n$.

- Calculez φ^2 .
- Donnez une condition nécessaire et suffisante pour que φ soit diagonalisable.
Déterminez alors les sous-espaces propres.

Solution:

- $\varphi^2(M) = \text{tr}(AM)\text{tr}(A)I_n = \text{tr}(A)\varphi(M)$.
- Donc le polynôme $X(X - \text{tr}(A))$ est annulateur de φ , et φ est diagonalisable si et seulement si $\text{tr}(A) \neq 0$ (sinon, la seule valeur propre étant 0, si φ était diagonalisable il serait nul).
Pour la valeur propre 0, le sous-espace propre est l'hyperplan $\{M \mid \text{tr}(AM) = 0\}$.
Pour la valeur propre $\text{tr}(A)$ le sous-espace propre est $\text{Vect}(I_n)$.

Exercice 56: CCP PC 2016

1. Déterminer, pour $a \in \mathbb{R}$, une base de l'image et une base du noyau de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} a & a & a & a \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & a & a & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}).$$

2. La matrice M est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$?

Exercice 57: CCP PSI 2018

CNS pour que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ soit diagonalisable ?

Solution:

$\chi_A = (X-2)(X-1)^2$. A diagonalisable si et seulement si $\dim E_1(A) = 2$ ce qui équivaut à $\text{rg}(A - I_3) = 1$. On trouve facilement que la CNS est $a = 0$

Exercice 58: ENSIIE 2003

Trouver les réels α tels que la matrice $A_\alpha = \begin{pmatrix} 3-\alpha & -5+\alpha & \alpha \\ -\alpha & \alpha-2 & \alpha \\ 5 & -5 & -2 \end{pmatrix}$ soit diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Dans ce cas la diagonaliser.

Solution:

Le polynôme caractéristique est $(3-x)(2+x)^2$. A est diagonalisable ssi $A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 5-\alpha & -5+\alpha & \alpha \\ -\alpha & \alpha & \alpha \\ 5 & -5 & 0 \end{pmatrix}$ est de rang 1 i.e. $\alpha = 0$
Si $\alpha = 0$: base de vecteurs propres pour $\lambda = 3$ $V_1 = (1, 0, 1)$ $\lambda = 2$ $V_2 = (1, 1, 0), V_3 = (0, 0, 1)$.

Exercice 59: CCP PSI 2018

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

- Montrez que A n'admet pas de polynôme annulateur non nul de degré ≤ 2 .
- Déterminez un polynôme annulateur de A .
- En déduire que A est inversible et précisez A^{-1} .
- Explicitiez l'ensemble des polynômes annulateurs de A .

Solution:

- Par calcul on vérifie que $aA^2 + bA + cI_3 = 0 \implies a = b = c = 0$.
- $\chi_A = X^3 + 1$ est annulateur de A par Cayley-Hamilton.
- $A^3 = -I_3$ prouve que A est inversible et que $A^{-1} = -A^2$.
- tous les polynômes multiples de $(X^3 + 1)$ sont annulateurs de A .
Réciproquement, si P non nul annule A , il est de degré ≥ 3 et la division euclidienne de P par χ_A s'écrit :
 $P = (X^3 + 1)Q + R$ donc R annule A mais comme $\text{deg}(R) \leq 2$ on a $R = 0$ et P multiple de χ_A .

Exercice 60: CCP PSI 2018

On pose $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $M = \begin{pmatrix} a & c & b \\ c & a+b & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$.

- Diagonalisez K .
- Écrire M à l'aide de puissances de K .
- Diagonalisez M et calculez M^n .

Solution:

a) K est symétrique réelle donc diagonalisable. $\chi_K = X(X^2 - 2)$

$$E_0(K) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad E_{\sqrt{2}}(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}; \quad E_{-\sqrt{2}}(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

b) $K^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc $M = (a-b)I_3 + cK + bK^2$.

c) Calcul : $K = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(0, \sqrt{2}, -\sqrt{2})$ donc $M = P \underbrace{((a-b)I_2 + cD + bD^2)}_{\Delta} P^{-1}$ puis $M^n = P\Delta^n P^{-1}$.

Il vaut mieux choisir P orthogonale c'est-à-dire normer les vecteurs propres (orthogonaux) trouvés précédemment :

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ de sorte que } P^{-1} = {}^tP \text{ et il faut ensuite faire le calcul de } P\Delta^n P^{-1} \dots \text{ Passionnant!}$$

Exercice 61: ENSEA PSI 2016

Soit $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} A^n$.

Solution:

A étant triangulaire supérieure, $\text{Sp}(A) = \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\right\}$. Donc A est diagonalisable et si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1)$, on aura $A^n = PD^n P^{-1}$ ce qui par continuité de l'application $M \mapsto PMP^{-1}$ (linéaire en dimension finie) permet déjà de dire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} A^n$ existe et vaut $P \text{diag}(0, 0, 0, 1) P^{-1}$.

Comme je n'ai pas envie de calculer P et encore moins P^{-1} soyons astucieux.

La division euclidienne de X^n par χ_A s'écrit

$$X^n = \chi_A Q + a_n X^3 + b_n X^2 + c_n X + d_n (*)$$

d'où $A^n = a_n A^3 + b_n A^2 + c_n A + d_n I_4$. Puisque la limite de A^n existe, il en est de même des limites des suites (a_n) , (b_n) , (c_n) et (d_n) . Notons a, b, c, d leurs limites. En remplaçant X par $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ et 1 dans $(*)$ on a le système

$$\begin{cases} 0 = d_n \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{a_n}{27} + \frac{b_n}{9} + \frac{c_n}{3} + d_n \\ \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{8a_n}{27} + \frac{4b_n}{9} + \frac{2c_n}{3} + d_n \\ 1 = a_n + b_n + c_n + d_n \end{cases}$$

ce qui en passant à la limite donne le système :

$$\begin{cases} 0 = d \\ 0 = \frac{a}{27} + \frac{b}{9} + \frac{c}{3} + d \\ 0 = \frac{8a}{27} + \frac{4b}{9} + \frac{2c}{3} + d \\ 1 = a + b + c + d \end{cases}$$

qu'il « suffit » de résoudre, puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} A^n = aA^3 + bA^2 + cA + dI_4 \dots$

Exercice 62: CCP PSI 2010

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Calculer le polynôme caractéristique χ_A de A .
- Déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par χ_A .
- Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 63: CCP PSI 2016 2018

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -3 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$. On pose

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Montrer que $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(u^2) \oplus \text{Ker}(u - 2\text{Id})$.
- Montrer que $\text{Ker } u \neq \text{Ker}(u^2)$.
- Montrez qu'il existe une base dans laquelle la matrice de u est T .
- Déterminez les endomorphismes v qui commutent avec u .

Solution:

- $\chi_u = X^2(X - 2)$. On calcule la matrice de u^2 et on trouve que $\text{Ker } u^2$ est le plan d'équation $x + y - z = 0$. Puis $E_1(u) = \text{Ker}(u - 2\text{Id}) = \text{Vect}(1, 1, 0)$. Ce vecteur n'appartient pas au plan précédent donc les sous-espaces sont bien supplémentaires.
- $\text{rg}(u) = 2$, donc $\dim \text{Ker } u = 1$, et $\dim \text{Ker } u^2 = 2$.
- On choisit $e_2 \in \text{Ker}(u^2) \setminus \text{Ker } u$, puis $e_1 = u(e_2)$ et $e_3 \in E_2(u)$.
- En considérant la matrice de v dans la base précédente, on est ramené à chercher les matrices $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ qui commutent avec T : simple calcul!

Exercice 64: CCP PSI 2019 2021

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $B \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ donnée par : $B = \begin{bmatrix} 0 & A \\ I_n & 0 \end{bmatrix}$.

- Exprimer le rang de B en fonction de celui de A .
- Calculer le polynôme caractéristique de B en fonction de celui de A .
- Déterminer les dimensions des sous-espaces propres de B en fonction de celles des sous-espaces propres de A .
- Montrer que : B diagonalisable $\iff A$ diagonalisable et inversible.

Solution:

-
-

$$\begin{aligned} \chi_B(\lambda) &= \begin{vmatrix} -\lambda I_n & I_n \\ A & -\lambda I_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda I_n & I_n \\ A - \lambda^2 I_n & 0 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \begin{vmatrix} A - \lambda^2 I_n & 0 \\ -\lambda I_n & I_n \end{vmatrix} = (-1)^n \det(A - \lambda^2 I_n) \\ &= (-1)^n \chi_A(\lambda^2). \end{aligned}$$

- $\dim E_B(\pm\sqrt{\lambda}) = \dim E_A(\lambda)$ par $Y \rightarrow [\lambda Y Y]$
- Supposons A diagonalisable et inversible. On a donc n vecteurs propres $(V_1, \dots, V_n)$ associés à des valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ et formant une base de $\mathbb{C}^n$, on pose alors, pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $W_k^\pm = \begin{pmatrix} V_k \\ \pm \mu_k V_k \end{pmatrix}$ où μ_k

est une racine dans $\mathbb{C}$ de λ_n , ce qui donne $2n$ vecteurs propres linéairement indépendants (à détailler...car tous les λ_k sont non nuls). On a donc montré $\Leftarrow$.

- Supposons B diagonalisable. Il existe donc un polynôme scindé simple P tel que $P(B) = 0$. D'autre part, une récurrence simple montre que pour tout entier p , on a $B^{2p} = \begin{bmatrix} A^p & 0 \\ 0 & A^p \end{bmatrix}$ et $B^{2p+1} = \begin{bmatrix} 0 & A^{p+1} \\ A^p & 0 \end{bmatrix}$. Donc si on pose $P(X) = Q(X^2) + XR(X^2)$ (on sépare les puissances paires et impaires et impaires), on aura $P(B) = \begin{bmatrix} Q(A) & AR(A) \\ AR(A) & Q(A) \end{bmatrix}$. Donc $Q(A) = R(A) = 0$ puis $P(A) = 0$: A est donc diagonalisable. De plus, Q et R sont annulateurs de A . Donc si Π est le polynôme minimal de A , Π divise Q et R , donc $\Pi(X^2)$ divise $P(X)$. P étant à racines simples, 0 ne peut être racine de Π et A est inversible.

Exercice 65: MINES-PONTS PSI 2017 2018

- a) Soit $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Déterminez l'inverse de $\begin{bmatrix} I_n & D \\ 0_n & I_n \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$.
- b) Soient A et B deux matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\text{Sp}(A) \cap \text{Sp}(B) = \emptyset$.
 - i) Montrez pour toute matrice $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il existe $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $AD - DB = C$.
 - ii) Soit $N = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$ et $M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$. Montrez que N et M sont semblables. Sont-elles diagonalisables?
- c) Commentez le cas $n = 1$.

Solution:

1. $\begin{bmatrix} I_n & -D \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$.
2. a) Cela revient à montrer que l'application $\varphi: D \mapsto AD - DB$ est bijective, et comme il s'agit d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, il suffit de montrer qu'elle est injective. Soit donc M telle que $\varphi(M) = 0$ c'est-à-dire $AM = MB$. Alors par récurrence on montre que $A^k M = MB^k$ pour tout entier k ; puis par linéarité on en déduit $P(A)M = MP(B)$ pour tout polynôme P . En prenant $P = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(A)} (X - \lambda)$; qui est annulateur de A car A diagonalisable, on a $MP(B) = 0$; or $P(B)$ est inversible car spectres disjoints donc $M = 0$, cqfd.
- b) Soit D comme dans la question précédente. Alors $NU = UM$ avec $U = \begin{bmatrix} I_n & D \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$ inversible donc N et M semblables.
 M est diagonalisable car si $P^{-1}AP = \Delta$ diagonale et $-Q^{-1}BQ = \Delta'$ diagonale, un produit par blocs montrer que $R^{-1}MR = \begin{bmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & \Delta' \end{bmatrix}$, avec $R = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix}$. N étant semblable à M , ell est aussi diagonalisable.
3. Dans le cas $n = 1$ on obtient $\begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}$ diagonalisable pour tout c dès que $a \neq b$.

III. ALGÈBRE BILINÉAIRE

Exercice 66: CCP PSI 2019 2021

Soit E un espace vectoriel euclidien et $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une famille de vecteurs de E telle que $\sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 < 1$.

1. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels. Montrez :

$$\left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \right\|^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2.$$

2. En déduire que la famille $(e_i + u_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de E .

Solution:

1. En développant, $\left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \right\|^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \lambda_i \lambda_j \langle u_i | u_j \rangle \leq \left(\sum_{i=1}^n |\lambda_i| \|u_i\| \right)^2$ en utilisant C.S, puis on utilise C.S ds $\mathbb{R}^n$.
2. Si $\sum_{i=1}^n \lambda_i (u_i + e_i) = 0$ alors $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$. Or $\left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2$ et Q1 donne $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2$ d'où $\sum_i \lambda_i^2 = 0$ compte tenu de l'hypothèse.

Exercice 67: CCP PSI 2016

Pour P et Q dans $\mathbb{R}_n[X]$ on pose : $\varphi(P, Q) = \sum_{k=0}^n P(k)Q(k)$.

Montrer qu'il s'agit d'un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$ et trouver une base orthonormée pour ce produit scalaire.

Solution:

| Produit scalaire : facile.

| Pour une base orthonormée, penser aux polynômes d'interpolation de Lagrange L_i tels que $L_i(k) = \delta_{i,k}$.

Exercice 68: CCP PSI 2016 2021

Sur $\mathbb{R}_n[X]$ on définit l'application $\varphi : (P, Q) \mapsto \sum_{k=0}^n P(k)Q(k)$.

1. Montrer qu'il s'agit d'un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Montrer que l'ensemble $E = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(1) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$ et préciser sa dimension.
3. Calculer $d(1, E)$.

Solution:

| Corrigé en classe

Exercice 69: CCP PSI 2018

- a) Montrer que l'application $(P, Q) \mapsto \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$.
- b) Déterminer le projeté orthogonal de $1 + X + X^2$ sur $F = \{Q \in \mathbb{R}_2[X] \mid Q'(0) = 0\}$.

Solution:

a) cours

b) On remarque déjà que $F = \text{Vect}(1, X^2)$. Deux méthodes possibles :

– On cherche une base orthogonale de F . On choisit $e_1 = 1$ et on cherche $e_2 = X^2 + a$ tel que $\langle e_1 | e_2 \rangle = 0$, on trouve $e_2 = X^2 - \frac{1}{3}$.

Puis on applique bêtement la formule du cours :

$$p(1 + X + X^2) = \sum_i \frac{(1 + X + X^2 | e_i)}{\|e_i\|^2} e_i = \left(2 + \frac{2}{3}\right) \frac{1}{2} e_1 + \frac{8}{45} \frac{45}{8} e_2 = X^2 + 1.$$

– Deuxième méthode : on cherche directement le projeté sous la forme $p(1 + X + X^2) = aX^2 + b$ en écrivant que le vecteur $(1 + X + X^2) - p(1 + X + X^2)$ est orthogonal à F c'est-à-dire à 1 et à X^2 , d'où deux équations que l'on résout.

Exercice 70: CCP MP 2001

Soit E un espace vectoriel préhilbertien réel, et soit $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que : $\forall x \in E, \langle x | v(x) \rangle = 0$. Montrer que $\text{Ker } v = (\text{Im } v)^\perp$.

Solution:

Pour tout $x, y \in E$, on a $\langle x + y | v(x + y) \rangle = 0 = \langle x | v(x) \rangle + \langle y | v(y) \rangle + \langle x | v(y) \rangle + \langle y | v(x) \rangle$, ce qui montre $\langle x | v(y) \rangle + \langle y | v(x) \rangle = 0$. (v est antisymétrique!)

Soit $x \in \text{Ker } v$ et $y \in \text{Im } v$. Alors $y = v(z)$ et $\langle x | y \rangle = \langle x | v(z) \rangle = -\langle v(x) | z \rangle = 0$. Ceci montre que $\text{Ker } v \subset (\text{Im } v)^\perp$.

Soit $x \in (\text{Im } v)^\perp$. Alors $\forall y \in E$, $\langle x | v(y) \rangle = 0 = -\langle v(x) | y \rangle$. Cela montre que $v(x) = 0$. Donc $(\text{Im } v)^\perp \subset \text{Ker } v$.

Exercice 71: ENSAM PSI 2018

- a) Donnez le rang de la matrice $M = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminez son noyau et son image, une base orthogonale du noyau et de l'image, puis montrez que ces deux espaces sont orthogonaux.
- b) Diagonalisez M . De quel endomorphisme s'agit-il?
- c) Montrez que $A = I_4 + M$ est inversible que la suite $(A^{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une matrice que l'on déterminera.
- d) Déterminez la matrice S de la symétrie orthogonale par rapport à $\text{Im } M$.

Solution:

- a) $C_1 = -C_3$ et $C_2 = -C_4$ donc $\text{rg } M = 2$ et $\text{Im } M$ est engendrée par exemple par C_1 et C_2 .

Le théorème du rang donne $\dim \text{Ker } M = 2$; puisque les vecteurs $E_1 + E_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $E_2 + E_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ appartiennent à $\text{Ker } M$ (compte tenu des relations sur les colonnes), ils en forment une base.

- b) M symétrique réelle donc diagonalisable. On constate que $MC_1 = C_1$ et $MC_2 = C_2$, donc $\text{Im } M = \text{Ker}(M - I)$ et M est la projection sur $\text{Im } M$ parallèlement à $\text{Ker } M$. C'est même une projection orthogonale.
- c) -1 non valeur propre de M donc $I + M$ inversible.
En notant P la matrice dont les colonnes sont $[C_1, C_2, E_1 + E_3, E_2 + E_4]$ et $D = \text{diag}(1, 1, 0, 0)$, on a $M = PDP^{-1}$ donc $A = PD'P^{-1}$ avec $D' = I_4 + D = \text{diag}(2, 2, 1, 1)$ puis

$$A^{-n} = PD'^{-n}P^{-1} = P \text{diag}(2^{-n}, 2^{-n}, 1, 1)P^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P \text{diag}(0, 0, 1, 1)P^{-1} = I - M.$$

- d) $s_F = 2p_F - \text{Id}$ donc $S = 2M - I$.

Exercice 72:

- Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\text{Ker } {}^tAA = \text{Ker } A$.
 A désigne désormais une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A{}^tA = {}^tAA$.
- On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = 0$. Montrer que $A = 0$.
- On suppose qu'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ et $q \in \mathbb{N}^*$ tels que $P^q(A) = 0$. Montrer que $P(A) = 0$.
- En déduire que A admet un polynôme annulateur dont toutes les racines complexes sont simples.

Solution:

- a) $\text{Ker } A \subset \text{Ker } {}^tAA$ est immédiat.
Ensuite, si $X \in \text{Ker } {}^tAA$ alors ${}^tAAX = 0$ donc ${}^tX{}^tAAX = 0$ c'est-à-dire $\|AX\|^2 = 0$ d'où $X \in \text{Ker } A$ ce qui donne l'inclusion réciproque.
- b) Soit $S = {}^tAA$. Puisque A et tA commutent on a $S^p = ({}^tA)^p A^p = 0$. Donc la seule valeur propre de S est 0; S étant symétrique réelle est diagonalisable d'où finalement $S = 0$.
Ainsi ${}^tAA = 0$ donc $A = 0$ d'après la 1ère question.
- c) Il suffit de remarquer que $P^q(A) = [P(A)]^q$, que $P(A)$ et ${}^tP(A) = P({}^tA)$ commutent puis d'appliquer le résultat de la question précédente.
- d) Soit Π un polynôme annulateur de A , que l'on écrit $\Pi = k \prod_i (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ où les λ_i sont des complexes distincts. En multipliant Π par un polynôme convenable, ce qui donnera encore un polynôme annulateur de

A , on obtient un polynôme annulateur de la forme polynôme $\left[\prod_i (X - \lambda_i) \right]^q$. D'après la question précédente, on conclut que le polynôme $\prod_i (X - \lambda_i)$ est encore annulateur de A .

Exercice 73: MINES-PONTS PC 2017

Soient E un espace euclidien et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On définit, pour $x \in E$, $f(x) = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$.

Montrer que f est un endomorphisme. Est-il injectif? surjectif?

Montrer qu'il est symétrique. A quelle condition est-il un projecteur?

Solution:

- La linéarité vient de la bilinéarité du produit scalaire. Et f est bien à valeurs dans $E \dots$
- Cherchons son noyau : $\forall x \in E, f(x) = 0 \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \langle x, e_i \rangle = 0$ car (e_i) base donc libre
Alors $x \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x) = 0 \Leftrightarrow x \in e^\perp = \{0\} : \text{Ker}(f) = \{0\}$ et f est injective.
Endomorphisme en dimension finie, f est donc aussi surjective (bijective).
- $\forall (r, s) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \langle f(e_r), e_s \rangle = \sum_{i=1}^n \langle e_r, e_i \rangle \langle e_i, e_s \rangle$ qui du fait de la symétrie du produit scalaire vaut aussi $\langle e_r, f(e_s) \rangle : f$ est symétrique.
- f est un projecteur ssi $f \circ f = f$, i.e. ssi $\forall r \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(f(e_r)) = f(e_r)$
Or $f(f(e_r)) = f(e_r) \Leftrightarrow f(e_r) = e_r$ car f est injective.
Ceci étant vrai pour tout r , f est alors l'application identité (qui est bien une projection)
Remarque : On peut aussi voir que si c'est un projecteur, c'est sur $\text{Im}(f)$ parallèlement à $\text{Ker}(f) \dots$ valant respectivement E et $\{0\}$ car f est bijective (ou bien parce que la seule projection bijective est l'identité!)
Mais alors $\forall r \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(e_r) = \sum_{i=1}^n \langle e_r, e_i \rangle e_i = e_r \Leftrightarrow \forall r \in \llbracket 1, n \rrbracket, \begin{cases} \langle e_r, e_i \rangle = 0 & \text{si } i \neq r \\ \langle e_r, e_i \rangle = 1 & \text{si } i = r \end{cases}$
Donc f est une projection $\Leftrightarrow (e_i)$ est une base orthonormée, et f est alors l'identité.

Exercice 74: MINES-PONTS PSI 2018

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $u \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$.

1. Montrez que $\mathbb{R}^n = \text{Ker}(u - \text{Id}) \oplus \text{Im}(u - \text{Id})$.

2. On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u^k$. Montrez que la suite (v_n) converge et trouvez sa limite.

Solution:

- a)** Si $x \in \text{Ker}(u - \text{Id}) \cap \text{Im}(u - \text{Id})$, $x = u(y) - y$ et $u(x) = x$ donc $u^2(y) = 2u(y) - y$
puis $\|y\|^2 = \|u^2(y)\|^2 = 4\|u(y)\|^2 + \|y\|^2 - 4\langle u(y) | y \rangle$
donc $\|u(y)\|^2 = \|u(y)\| \|y\| = \langle u(y) | y \rangle$: cas d'égalité de Cauchy-Schwarz d'où $u(y) = \lambda y$ avec $\lambda \geq 0$ donc $\lambda = 1$ donc $x = 0$.
Ainsi $\text{Ker}(u - \text{Id}) \cap \text{Im}(u - \text{Id}) = \{0\}$ et on conclut par le théorème du rang.
- b)** Soit $x \in E$; on écrit en vertu de ce qui précède $x = y + z$ avec $u(y) = y$ et $z = u(t) - t$. Puisque $u^k(y) = y$ pour tout entier k , on a $v_n(x) = y + v_n(z)$ et $v_n(z) = \frac{1}{n} (u^n(t) - t)$ (car $(u - \text{Id}) \circ (\text{Id} + u + \dots + u^{n-1}) = u^n - \text{Id}$).
Donc $\|v_n(z)\| \leq \frac{2}{n} \|t\|$ puisque u^n est une isométrie, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n(z) = 0$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n(x) = y$ c'est-à-dire que (v_n) a pour limite la projection orthogonale sur $\text{Ker}(u - \text{Id})$ ($\text{Im}(u - \text{Id}) = (\text{Ker}(u - \text{Id}))^\perp$ se vérifie aisément).

Exercice 75:

Déterminer $\min_{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3} \int_0^{+\infty} (x^3 + ax^2 + bx + c)^2 e^{-2x} dx$.

Exercice 76: CCP PSI 2016

Soit E un espace vectoriel euclidien et $u \in E$.

Déterminer les réels α tels que l'application $x \mapsto \alpha \langle u | x \rangle u - x$ soit une isométrie de E .

Solution:

On peut supposer $u \neq 0$ sinon c'est trivial.

Dans ce cas, écrire la matrice de l'endomorphisme dans une base orthonormée dont le premier vecteur est $\frac{u}{\|u\|}$.

Exercice 77:

Soit E un espace vectoriel euclidien, p et q deux projecteurs orthogonaux de E . Montrer que les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) $p \circ q = q \circ p$
- (ii) $p \circ q$ est un projecteur orthogonal.
- (iii) p et q possèdent une base commune de diagonalisation.

Exercice 78: CENTRALE PSI 2015, MINES-PONTS PSI 2016 2017 2018

Soient p et q deux projecteurs orthogonaux d'un espace euclidien E , et $u = p + q$.

- a) Montrer que le polynôme caractéristique de u est scindé dans $\mathbb{R}[X]$.
- b) Montrer que $\text{Sp}(u) \subset [0; 2]$.
- c) Déterminer $\text{Ker } u$ et $\text{Ker}(u - 2\text{Id})$ en fonction de $\text{Im } p$ et $\text{Im } q$.

Solution:

- a) p et q sont deux endomorphismes symétriques, donc u aussi. u est donc diagonalisable.
- b) On sait que pour un projecteur orthogonal, $\|p(x)\| \leq \|x\|$ pour tout x donc $\|u(x)\| \leq 2\|x\|$. Soit λ une valeur propre de u et x un vecteur propre associé. Alors $\|u(x)\| = \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \leq 2\|x\|$ implique $|\lambda| \leq 2$ puisque $x \neq 0$. De plus, pour tout x , $\langle p(x) | x \rangle = \|p(x)\|^2 \geq 0$, idem pour q , donc $\langle u(x) | x \rangle \geq 0$ d'où $\lambda \geq 0$.
- c) $\|u(x)\| = \|(p+q)(x)\| \leq \|p(x)\| + \|q(x)\| \leq \|x\| + \|x\|$ donc si $u(x) = 2x$ il y a égalité dans ces inégalités, donc $\|p(x)\| = \|x\|$, idem pour q , donc $p(x) = x$ et $q(x) = x$ soit $x \in \text{Im } p \cap \text{Im } q$. L'inclusion réciproque est immédiate. Si $p(x) + q(x) = 0$ alors $\langle p(x) + q(x) | x \rangle = 0$ et par positivité, $\langle p(x) | x \rangle = \langle q(x) | x \rangle = 0$ donc $x \in \text{Ker } p \cap \text{Ker } q$. Inclusion réciproque immédiate. En conclusion, $\text{Ker}(u - 2\text{Id}) = \text{Im } p \cap \text{Im } q$ et $\text{Ker } u = \text{Ker } p \cap \text{Ker } q = (\text{Im } p)^\perp \cap (\text{Im } q)^\perp$.

Exercice 79:

Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension $n \geq 1$, et $u \in GL(E)$ tel que :

$$\forall (x, y) \in E, \langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow \langle u(x), u(y) \rangle = 0$$

Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que : $\forall x \in E, \|u(x)\| = \alpha \|x\|$ (utiliser une base orthonormée).

Exercice 80: CCP PC 2002, CCP PSI 2014 2015 2021, MINES-PONTS PSI 2021

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^t A = {}^t A A$.

On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = 0$. On note $S = {}^t A A$.

- 1. Montrer que $S = 0$.
- 2. En déduire que $A = 0$.

Solution:

S est symétrique, donc diagonalisable. De plus S est nilpotente grâce à la commutation de A et ${}^t A$. Donc S est nulle car seule valeur propre 0. Donc $\text{tr } S = \sum_{i,j} a_{ij}^2 = 0$ donc tous les coefficients de A sont nuls, donc $A = 0$.

Exercice 81: MINES-PONTS PSI 2017 2021

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique et $B = A^3 + A + I_n$. Montrez que A est un polynôme en B .

Solution:

On diagonalise avec le théorème spectral : $Q^{-1}AQ = \text{diag}(\lambda_i)$.

Si P est un polynôme quelconque on aura donc $Q^{-1}P(B)Q = \text{diag}(P(\lambda_i^3 + \lambda_i + 1))$.

Il suffit donc de trouver un polynôme P tel que $P(\mu_i) = \lambda_i$ en posant $\mu_i = \lambda_i^3 + \lambda_i + 1$.

Or si les $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont distincts, il en est de même des $\mu_1, \dots, \mu_p$ car l'application $x \mapsto x^3 + x + 1$ est injective (faire une étude ultra-rapide); d'après la théorie des polynômes d'interpolation de Lagrange, il est donc possible de trouver un polynôme P (de degré $\leq p - 1$) tel que $P(\mu_i) = \lambda_i$ pour $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$ donc en fait pour tous les $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ (car ceux qui manquent sont égaux à certains précédents), cqfd.

Exercice 82: CCP PSI 2012, MINES-PONTS PSI 2021

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $S = \frac{1}{2}(A + {}^tA)$. On note $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ le spectre ordonné de S . Si μ est une valeur propre réelle de A , montrez $\lambda_1 \leq \mu \leq \lambda_n$.

Solution:

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ une base orthonormée de vecteurs propres de S .

Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$: on écrit $X = \sum_{i=1}^n x_i X_i$ donc $SX = \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i X_i$ donc

$${}^tXSX = \sum_{i,j} \lambda_j x_i x_j \underbrace{{}^tX_i X_j}_{=\delta_{ij} \text{ car bon}} = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2$$

donc

$$\lambda_1 \|X\|^2 \leq {}^tXSX \leq \lambda_n \sum_i x_i^2 = \lambda_n \|X\|^2.$$

Puis ${}^tXSX = \frac{1}{2}({}^tXAX + {}^tX^tAX) = {}^tXAX$ (car tXAX est réel donc égal à sa transposée).

Si μ est une valeur propre réelle de A et X un vecteur propre associé, on a $AX = \mu X$ d'où ${}^tXSX = \mu \|X\|^2 \leq \lambda_n \|X\|^2$ puis $\mu \leq \lambda_n$ puisque $X \neq 0$. Idem pour l'autre inégalité.

Exercice 83: CCINP PSI 2021

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M \neq I_n$, $M^3 = I_n$ et ${}^tMM = M^tM$.

- Montrez $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.
- Déterminez toutes ses matrices vérifiant ces hypothèses sur $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Solution:

- On a $({}^tMM)^3 = I_n$ avec tMM symétrique réelle d'où (classique, on orthodiagonalise) ${}^tMM = I_n$
- M diagonalisable dans $\mathbb{C}$ avec $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(M) \subset \{1, j, j^2\}$ donc $M = I_n$ ou rotation d'angle $2\frac{\pi}{3}$ (revoir la classification des isométries en dimension 3).

Exercice 84: CENTRALE PC 2006

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que ${}^tAA = A^2$.

- Montrer que $\text{rg}({}^tAA) = \text{rg}(A)$.
- Montrer que $\mathbb{R}^n = \text{Ker}(A) \oplus \text{Im}(A)$.
- Montrer que A est symétrique.

Solution:

- voir un exo précédent. On en déduit $\text{Ker } {}^tAA = \text{Ker } A$ (une inclusion + dimensions).
- Soient $X \in \text{Ker } A$ et $Y \in \text{Im } A$. On écrit $Y = AZ$ puis

$$\langle X | Y \rangle = \langle X | AZ \rangle = \langle {}^tAX | Z \rangle = 0$$

en vertu du fait que $\text{Ker}(A) = \text{Ker}({}^tA)$. Ainsi, la somme est bien orthogonale, et donc directe.

De par les dimensions, on a alors $E = \text{Ker } A \oplus \text{Im } A$.

- Enfin, on considère une base orthonormée adaptée à $\text{Ker } A \oplus \text{Im } A$:

$$A = \Omega \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

et de l'égalité $A^t A = A^2$ on tire $B^t B = B^2$. Sauf que cette fois-ci, B est inversible, donc en multipliant par B^{-1} à gauche : ${}^t B = B$. Par conséquent, A est symétrique.

Exercice 85: CCINP PSI 2021

Soient $U \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $M = \begin{bmatrix} 1 & -{}^t U \\ U & I_n \end{bmatrix}$.

1. Calculez ${}^t M M$. En déduire que M est inversible.
2. Montrez que $M^{-1} {}^t M$ est une matrice orthogonale.

Solution:

On supposera dans toute la suite $U \neq 0$ (sinon c'est terminé).

1. $M = I_{n+1} + A$ avec $A = \begin{bmatrix} 0 & -{}^t U \\ U & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ donc ${}^t M M = (I_{n+1} - A)(I_{n+1} + A) = I_{n+1} - A^2$ avec

$$A^2 = \begin{bmatrix} -\|U\|^2 & 0 \\ 0 & -U {}^t U \end{bmatrix}.$$

Or la matrice $U {}^t U$ est symétrique réelle de rang 1; elle admet donc 0 pour valeur propre d'ordre $n-1$ et $\text{tr}(U {}^t U) = \|U\|^2$ comme valeurs propres. Les valeurs propres de A^2 sont donc $-\|U\|^2$ (double) et 0 (d'ordre $n-1$) donc celles de ${}^t M M$ sont $1 + \|U\|^2$ et 1.

Puisque 0 n'est pas valeur propre, la matrice ${}^t M M$ est inversible et puisque $\det({}^t M M) = (\det M)^2$, il en est de même de M .

2. $M^{-1} {}^t M (M^{-1} {}^t M) = (I_{n+1} + A)^{-1} (I_{n+1} - A) (I_{n+1} + A) (I_{n+1} - A)^{-1} = I_{n+1}$ car toutes ces matrices commutent entre elles (on rappelle que A commute avec toute matrice de la forme $P(A)$ où P polynôme, et que si A commute avec B inversible, elle commute aussi avec B^{-1}).

Exercice 86: CCP MP 2010, PSI 2013, PSI 2016...

On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire usuel noté $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Soit f un endomorphisme symétrique de $\mathbb{R}^n$ dont toutes les valeurs propres sont strictement positives.

1. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \langle f(x) | x \rangle > 0$$

2. Soit u un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$g(x) = \frac{1}{2} \langle f(x) | x \rangle - \langle u | x \rangle$$

Montrer que g admet des dérivées partielles selon tout vecteur de $\mathbb{R}^n$ et les expliciter.

3. Montrer que g admet un unique point critique noté z .
4. Montrer que g admet un minimum global en z .

Solution:

1. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de vecteurs propres de f . Pour

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

on a

$$f(x) = \lambda_1 x_1 e_1 + \dots + \lambda_n x_n e_n$$

avec $\lambda_i > 0$ valeur propre associée au vecteur propre e_i .

Ainsi, pour $x \neq 0$,

$$\langle f(x) | x \rangle = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2 > 0$$

2. Par opérations, la fonction g est de classe C^1 donc admet des dérivées partielles relatives à n'importe quelle base.

Dans la base $(e_1, \dots, e_n)$, ses dérivées partielles sont

$$D_i g(x) = \lambda_i x_i - u_i$$

en notant $u_1, \dots, u_n$ les composantes de u .

3. Il est alors immédiat que g admet un unique point critique qui est

$$z = \frac{u_1}{\lambda_1} e_1 + \dots + \frac{u_n}{\lambda_n} e_n = f^{-1}(u)$$

4. Pour $h \in E$,

$$g(f^{-1}(u) + h) = \frac{1}{2}(u + f(h)|f^{-1}(u) + h) - (u|f^{-1}(u) + h)$$

donc

$$g(f^{-1}(u) + h) = g(f^{-1}(u)) + \frac{1}{2}(f(h)|h) \geq g(f^{-1}(u))$$

car $(f(h)|f^{-1}(u)) = (h|u)$ par symétrie.

Exercice 87: CCP PC 2005, MINES-PONTS PSI 2018

On note

$$\mathcal{A}_n = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ tq } {}^tM = -M\}$$

$$\mathcal{B}_n = \{M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \text{ tq } -1 \notin \text{Sp}(M)\}$$

$$\mathcal{C}_n = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ tq } {}^tM = M \text{ et } \text{Sp}(M) \subset]0; 1[\}.$$

On définit $\phi : M \rightarrow (I_n - M) \cdot (I_n + M)^{-1}$ (c'est la transformation de Cayley).

1. Montrer que ϕ réalise une bijection de $\mathcal{A}_n$ dans $\mathcal{B}_n$.

2. Montrer que ϕ réalise une bijection involutive sur $\mathcal{C}_n$, c'est-à-dire que $\phi = \phi^{-1}$.

Solution:

1. Tout d'abord, si $A \in \mathcal{A}_n$, alors $1 \notin \text{Sp}(A)$ (démonstration classique). On peut donc poser $M = \phi(A) = (I - A)(I + A)^{-1}$. On vérifie alors que $(I + A)$ et $(I - A)$ commutent et donc que ${}^tM \cdot M = I_n$, ce qui prouve que $\phi(A) \in \mathcal{B}_n$. De plus, l'injectivité de ϕ est à peu près immédiate (attention, ϕ n'est pas linéaire!). Montrons la surjectivité de ϕ .

Tout d'abord on note que si $M \in \mathcal{B}_n$, alors $M + I_n$ est inversible donc $\phi(M)$ est bien défini. Notons $A = \phi(M) = (I_n - M) \cdot (I_n + M)^{-1}$. On a alors

$$\begin{aligned} {}^t(A) &= (I + {}^tM)^{-1}(I - {}^tM) = (I + M^{-1})^{-1} \cdot (I - M^{-1}) \\ &= (M + I)^{-1}M \cdot (I + M^{-1}) = (M + I)^{-1}(M - I). \end{aligned}$$

Or M commute avec $(M + I)^{-1}$ car il commute avec $(M + I)$ (multiplier à gauche et à droite par $(I + M)^{-1}$ la relation de commutation entre M et $(M + I)$ pour le voir), et I aussi, donc

$${}^tA = (M - I)(M + I)^{-1} = -{}^tA.$$

On a donc montré que $A = \phi(M) \in \mathcal{A}_n$. Par ailleurs, on tire de la définition de A les égalités suivantes :

$$\begin{aligned} A(I + M) &= I - M \\ MA + M &= I - A \\ M(I + A) &= I - A \\ M &= (I - A)(I + A)^{-1} = \phi(A) \end{aligned}$$

Ce qui montre donc la surjectivité de ϕ .

2. Même démarche; il faut noter que l'intervalle $]0, 1[$ est stable par $x \mapsto \frac{1-x}{1+x}$.

Exercice 88: CENTRALE PSI 2016

Soit $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ celui des matrices symétriques réelles à valeurs propres strictement positives.

1. Énoncer en entier le théorème spectral.

2. Pour $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ montrer qu'il existe $B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $A = B^2$.

3. Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$, montrer que ${}^tMM \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Montrer alors qu'il existe O orthogonale et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $M = OS$.

Solution:

Soit $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ celui des matrices symétriques réelles à valeurs propres strictement positives.

1. Théorème spectral :

Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée de vecteurs propres : il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et D diagonale telle que $D = {}^tPAP$.

2. On utilise le théorème spectral sur la matrice A , on note également $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_i > 0$ les valeurs propres de A .

Posons alors $B = P\Delta P^t$ avec $\Delta = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ ainsi

$$B^2 = P\Delta P^t P\Delta P^t = P\Delta^2 P = PD^t P = A$$

Ce qui prouve l'existence (l'unicité est également vraie mais bien plus difficile à prouver).

3. Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

Posons $A = {}^tMM$ on a de suite ${}^tA = {}^t({}^tMM) = {}^tMM = A$ donc A est symétrique et donc diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre de $A = {}^tMM$, il existe $X \neq 0$ tel que $AX = \lambda X$ et donc ${}^tXAX = \lambda {}^tXX$.

On a donc ${}^tXMMX = \lambda {}^tXX \Leftrightarrow \|MX\|^2 = \lambda \|X\|^2$ (pour la norme euclidienne).

On en déduit que $\lambda \geq 0$ mais comme $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$, alors $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et donc $\lambda > 0$. Finalement ${}^tMM \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Il s'agit de la décomposition polaire d'une matrice de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. On a vu que ${}^tMM \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ donc d'après le 2. il existe $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = {}^tMM$.

Posons alors $O = MS^{-1}$, on a les relations $M = OS$ mais aussi

$${}^tOO = {}^tS^{-1}{}^tMMS^{-1} = {}^tS^{-1}S^2S^{-1} = {}^tS^{-1}SSS^{-1} = I_n$$

donc $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. On a ainsi prouvé l'existence d'un couple O orthogonale et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $M = OS$.

(l'unicité est également vraie mais plus difficile à prouver : si $M = OS$ alors ${}^tMM = S^2$ et on utilise le fait que toute matrice symétrique définie positive admet une unique racine carrée symétrique définie positive. Voir par exemple Mines Maths 2 MP 2018 3è question)

Exercice 89: PSI 2016

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ dont toutes les valeurs propres sont strictement positives. Soit $B \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ de rang m .

1. Montrer que : $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), X \neq 0, {}^tXAX > 0$.

2. Justifier que $m \leq n$ Que peut-on dire de l'application linéaire u canoniquement associée à B ?

3. Montrer que la matrice par blocs $C = \begin{bmatrix} A & B \\ {}^tB & 0 \end{bmatrix}$ est inversible. Calculer C^{-1} lorsque $m = n$.

Solution:

1. A symétrique réelle donc orthodiagonalisable : il existe $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et P orthogonale telles que $A = PDP^{-1}$ avec $P^{-1} = {}^tP$.

Soit X une matrice colonne non nulle. Alors :

$${}^tXAX = {}^tXPD^tPX = {}^tYDY$$

avec $Y = {}^tPX$. Or ${}^tYDY = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$ d'où le résultat car les λ_i sont strictement positifs et le vecteur Y n'est pas nul puisque X ne l'est pas et P inversible.

2. $u : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ donc $\text{Im } u \subset \mathbb{R}^n$ donc $\text{rg } u \leq n$ soit $m \leq n$.

Le th. du rang donne $m = \text{rg } u + \dim \text{Ker } u$ donc u injective.

3. Notons déjà que A est inversible puisque 0 n'en est pas valeur propre.

Soit $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+m,1}(\mathbb{R})$ tel que $C \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 0$. Alors $AX + BY = 0$ et ${}^tBX = 0$ d'où ${}^tBA^{-1}BY = 0$ donc en multipliant par tY à gauche et avec les notations précédentes : ${}^tY{}^tBPD^{-1}{}^tPBY = 0$, soit encore ${}^tZD^{-1}Z = 0$ avec $Z = {}^tPBY$. Puisque ${}^tZD^{-1}Z = \sum \frac{1}{\lambda_i} z_i^2$ et que les λ_i sont > 0 on en déduit $Z = 0$ puis $BY = 0$ puis $Y = 0$ puisque B injective puis $AX = 0$ et enfin $X = 0$.

Finalement $\text{Ker } C = \{0\}$ donc C inversible.

Pour le calcul de l'inverse quand B est carrée donc inversible, faire un produit par blocs...

Exercice 90: ENSAM PSI 2016

L'espace $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure euclidienne canonique. Soit ω un vecteur non nul de $\mathbb{R}^3$ et

$$f: \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ x & \longmapsto \omega \wedge x \end{cases}.$$

1. Montrer que f est un endomorphisme et que : $\forall x, y \in \mathbb{R}^3, \langle f(x) | y \rangle = -\langle x | f(y) \rangle$.
2. Trouver un polynôme annulateur de f . f est-il diagonalisable ?
3. Montrer que l'endomorphisme $(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3}) \circ (f + \text{Id}_{\mathbb{R}^3})^{-1}$ est bien défini et déterminer ses propriétés géométriques.

Exercice 91: CCP PSI 2016

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On pose $B = {}^tAA$.

1. Montrer que B n'est pas inversible.
2. Montrer que B est diagonalisable.
3. Montrer que $0 \in \text{Sp}(B)$ et que $\text{Sp}(B) \subset \mathbb{R}_+$.
4. La matrice A est-elle orthogonale ?
5. Montrer que A et B commutent.
6. Montrer que si $\lambda \in \text{Sp}(A)$ alors $-\lambda \in \text{Sp}(A)$.