

**DS°5 ( le 08/01/2011)**

Le DS est constitué du sujet E4A MP 2009, qui suit. On remplacera le début de la partie III (questions 1 et 2) par les questions suivantes :

**Partie III**

Dans la suite du problème, on désigne par  $I$  l'intervalle  $]0, 1]$ .

Si  $f$  est une fonction continue par morceaux et à valeurs réelles positives sur cet intervalle, on dira que  $f$  est intégrable sur  $I$  si

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 f(x) dx \text{ existe}$$

Cette limite sera alors notée  $\int_0^1 f(x) dx$ .

1. Soit  $f$  une fonction continue par morceaux et à valeurs réelles positives sur  $I$ , et intégrable sur cet intervalle.

Soit alors  $g$  une fonction continue par morceaux sur  $I$  telle que

$$\forall x \in I, \quad 0 \leq g(x) \leq f(x)$$

Montrer que  $g$  est intégrable sur  $I$ .

2. Soit  $n$  un entier naturel. On considère la fonction  $f_n$  définie sur  $I$  par

$$\forall x \in I, \quad f_n(x) = x^n f(x)$$

- a) Montrer que  $f_n$  est intégrable sur  $I$ .

- b) Montrer que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0$ . [Indication : pour tout  $\varepsilon > 0$ , montrer qu'il existe  $\alpha > 0$  tel que

$$\int_0^\alpha f(x) dx < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ puis écrire } \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^\alpha x^n f(x) dx + \int_\alpha^1 x^n f(x) dx]$$

Dans la suite du problème, on note :

$$S_f = \int_0^1 \frac{f(x)}{1+x} dx \text{ et, } \forall n \in \mathbb{N}, u_n(f) = \int_0^1 f_n(x) dx$$

3. suite inchangée

GAN8



Concours ENSAM - ESTP - ARCHIMEDE

## Épreuve de Mathématiques A MP

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

---

L'usage de calculatrices est interdit.

### Problème

Dans tout le problème,  $\ln$  désigne le logarithme népérien.

#### Partie I

Soit  $x$  un nombre réel dans  $] -1, 1[$ .

1. Soit  $n$  un entier naturel non nul. Démontrer l'égalité :

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i x^i + \frac{(-1)^n x^n}{1+x}.$$

2. En déduire l'égalité :

$$\ln(1+x) = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^i + \int_0^x \frac{(-1)^n t^n}{1+t} dt.$$

3. Démontrer que la série  $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^i$  converge vers  $\ln(1+x)$ . On citera précisément le théorème utilisé.

4 Démontrer les égalités :

$$\ln(2) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} \quad (1)$$

$$\ln(2) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i 2^i} \quad (2)$$

5 Soit  $(u_n)_{n \geq 1}$  une suite décroissante de nombres réels qui converge vers 0.

i. Justifier que la série de terme général  $(-1)^{n-1} u_n$  converge.

ii. Soit  $S$  la somme de la série de terme général  $(-1)^{n-1} u_n$  et soit  $S_n$  la somme partielle  $\sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} u_i$ , pour tout entier naturel  $n \geq 1$ .

a) Démontrer que la suite  $(S_{2n})_{n \geq 1}$  est croissante et que la suite  $(S_{2n-1})_{n \geq 1}$  est décroissante.

b) Démontrer que  $S$  vérifie, pour tout entier naturel  $n$ , l'encadrement :

$$S_{2n} \leq S \leq S_{2n-1}.$$

iii. En déduire, pour tout entier naturel  $n \geq 1$ , l'inégalité :

$$|S - S_n| \leq u_n.$$

6. Soit  $p$  un entier naturel. Déterminer un entier naturel  $N_p$  tel que  $\sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{i}$  est une valeur approchée de  $\ln(2)$  à  $10^{-p}$ , pour tout entier naturel  $n \geq N_p$ .

7 Soit  $p$  un entier naturel. On se propose de calculer une valeur de  $\ln(2)$  à  $10^{-p}$  près en utilisant les sommes partielles  $(\sum_{i=1}^n \frac{1}{i 2^i})_{n \geq 1}$ .

i. Pour un entier naturel  $n \geq 1$ , on pose  $R_n = \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i 2^i}$ . Justifier l'inégalité :

$$0 \leq R_n \leq \frac{1}{2^n}.$$

ii. Déterminer un entier naturel  $N'_p$  tel que  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i 2^i}$  est une valeur approchée de  $\ln(2)$  à  $10^{-p}$ , pour tout entier naturel  $n \geq N'_p$ .

iii. Comparer  $N_p$  (introduit dans la question 5) et  $N'_p$ .

## Partie II

Soit  $n$  un entier naturel  $\geq 1$ . On désigne par  $\mathbb{R}_n[X]$  le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel formé par les polynômes à coefficients dans  $\mathbb{R}$  de degré  $\leq n$ .

1. Soit  $P$  dans  $\mathbb{R}_n[X]$ . Démontrer qu'il existe un unique polynôme dans  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ , noté  $\varphi_n(P)$  tel que  $P(-1) - P(X) = (X + 1)\varphi_n(P)(X)$ .
2. Soit  $\varphi_n$  l'application ainsi définie de  $\mathbb{R}_n[X]$  dans  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ . Démontrer que  $\varphi_n$  est une application linéaire. Déterminer le noyau de  $\varphi_n$ . L'application  $\varphi_n$  est-elle surjective ?
3. Ecrire la matrice de  $\varphi_n$  de la base  $1, X, X^2, \dots, X^n$  de  $\mathbb{R}_n[X]$  sur la base  $1, X, X^2, \dots, X^{n-1}$  de  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ .
4. Soit  $P$  le polynôme  $\sum_{i=0}^n a_i X^i$ . Démontrer que  $\varphi_n(P) = \sum_{j=0}^{n-1} b_j X^j$  où les nombres réels  $b_0, \dots, b_{n-1}$  sont définis par :

$$\forall j \in \{0, \dots, n-1\}, b_j = (-1)^j \sum_{i=j+1}^n (-1)^i a_i.$$

## Partie III

Dans la suite du problème, on désigne par  $I$  l'intervalle  $]0, 1]$ . Soit  $f$  une fonction continue par morceaux sur  $I$ , à valeurs réelles positives, et intégrable sur l'intervalle  $I$ .

1. Soit  $g$  la fonction définie par :

$$\forall x \in I, g(x) = \frac{f(x)}{1+x}.$$

Démontrer que  $g$  est intégrable sur l'intervalle  $I$ .

2. Soit  $n$  un entier naturel. On considère la fonction  $f_n$  définie sur l'intervalle  $I$  par :

$$\forall x \in I, f_n(x) = x^n f(x).$$

Démontrer que la fonction  $f_n$  est intégrable sur l'intervalle  $I$ .

Dans la suite du problème, on note :

$$S_f = \int_0^1 \frac{f(x)}{1+x} dx \text{ et, } \forall n \in \mathbb{N}, u_n(f) = \int_0^1 f_n(x) dx.$$

3. Démontrer que la série de terme général  $(-1)^n u_n(f)$  converge.
4. Justifier l'égalité  $\mathcal{E}_f : \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u_n(f) = S_f$ .
5. Que devient précisément l'égalité  $\mathcal{E}_f$  dans les cas suivants :
  - (i) La fonction  $f$  est la fonction constante égale à 1 sur l'intervalle  $I$ .
  - (ii) La fonction  $f$  est la fonction définie par :

$$\forall x \in I, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

- (iii) La fonction  $f$  est la fonction définie par :

$$\forall x \in I, f(x) = \frac{1}{3x^{2/3}}.$$

*Indication :* On pourra démontrer que  $S_f = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^3}$  et déterminer des nombres réels  $a, b, c$  tels que

$$\frac{1}{1+x^3} = \frac{a}{1+x} + \frac{b(-1+2x)}{1-x+x^2} + \frac{c}{1-x+x^2}.$$

## Partie IV

1. Soit  $P$  un polynôme et soit  $n$  son degré. Démontrer l'égalité :

$$\int_0^1 \frac{P(x)}{1+x} f(x) dx = P(-1)S_f - \int_0^1 \varphi_n(P)(x) f(x) dx.$$

Soit  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de polynômes à coefficients réels qui vérifient les propriétés suivantes :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} T_n \text{ est de degré } n, \\ T_n(-1) \neq 0 \end{cases}$$

On pose

$$S_n = \int_0^1 \varphi_n(T_n)(x) f(x) dx \quad \text{et} \quad M_n = \sup_{x \in [0,1]} |T_n(x)|.$$

2. Pour tout entier naturel  $n$ , démontrer l'inégalité :

$$\left| S_f - \frac{S_n}{T_n(-1)} \right| \leq \frac{M_n S_f}{|T_n(-1)|}.$$

### Partie V

Dans toute la suite du problème, on considère  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite de polynômes définie par récurrence par :

$$\begin{aligned} T_0(X) &= 1 \\ T_1(X) &= 1 - 2X \\ T_{n+2}(X) &= 2(1 - 2X)T_{n+1}(X) - T_n(X), \text{ pour } n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

1. Soit  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $v_n = T_n(-1)$ , pour tout entier naturel  $n$ .
  - (i) Etablir une relation entre  $v_{n+2}$ ,  $v_{n+1}$  et  $v_n$ , pour tout entier naturel  $n$ .
  - (ii) En déduire l'existence de nombres réels  $\alpha$  et  $\beta$  tels que pour tout entier naturel  $n$ ,  
 $v_n = \alpha(3 + \sqrt{8})^n + \beta(3 - \sqrt{8})^n$ .
  - (iii) Déterminer les nombres réels  $\alpha$  et  $\beta$ .
- 2 Justifier que la suite  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifie les hypothèses de la partie IV.
- 3 Démontrer que les coefficients du polynôme  $T_n(X)$  sont des entiers relatifs, pour tout entier naturel  $n$ .
- 4 Démontrer l'égalité  $T_n(\sin^2 x) = \cos(2nx)$ , pour tout entier naturel  $n$  et pour tout nombre réel  $x$ .
- 5 Soit  $n$  un entier naturel. Démontrer que  $M_n = 1$  et en déduire l'inégalité :

$$\frac{M_n}{|T_n(-1)|} \leq \frac{2}{(3 + \sqrt{8})^n}.$$

- 6 Expliquer comment construire une suite de nombres rationnels  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle qu'il existe une constante  $K$  strictement positive vérifiant, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$|\ln 2 - t_n| \leq \frac{K}{(3 + \sqrt{8})^n}.$$

## Partie VI

On suppose de plus dans cette partie que  $f$  est une fonction de classe  $\mathcal{C}^5$  sur l'intervalle  $[0, 1]$ . Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \frac{f(\sin^2 x) \sin 2x}{1 + \sin^2 x}.$$

1. Justifier que la fonction  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^5$  sur  $\mathbb{R}$ .
2. Soit  $P$  un polynôme. Démontrer l'égalité :

$$\int_0^1 \frac{P(x)}{1+x} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} P(\sin^2 t) g(t) dt.$$

3. Soit  $n$  un entier naturel non nul et soit  $T_n$  le  $n$ -ième polynôme de la suite introduite dans la partie V. Démontrer l'égalité :

$$4n^2 \int_0^1 \frac{T_n(x)}{1+x} f(x) dx = (-1)^n g'(\frac{\pi}{2}) - g'(0) - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) g''(x) dx.$$

4. Soit alors  $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite de polynômes définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, Q_n(x) = (n+2)^2 T_{n+2}(x) - n^2 T_n(x).$$

Soit  $n$  un entier naturel non nul.

- (i) Démontrer l'égalité :

$$\int_0^1 \frac{Q_n(x)}{1+x} f(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(2nx) - \cos(2(n+2)x)) g''(x) dx.$$

- (ii) On définit  $U$  et  $V$  par :

$$U = \int_0^1 \frac{Q_n(x)}{1+x} f(x) dx \quad \text{et} \quad V = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left( -\frac{\sin(2nx)}{n^3} + \frac{\sin(2(n+2)x)}{(n+2)^3} \right) g^{(5)}(x) dx.$$

Exprimer  $U$  en fonction de  $g^{(3)}(\frac{\pi}{2})$ ,  $g^{(3)}(0)$  et  $V$ .

- (iii) En déduire qu'il existe un nombre réel  $K$  tel que, pour tout entier naturel  $n$  non nul, on a :

$$\left| \int_0^1 \frac{Q_n(x)}{1+x} f(x) dx \right| \leq \frac{K}{n^3}.$$

5. Expliquer comment construire une suite de nombres rationnels  $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle qu'il existe une constante  $K$  strictement positive vérifiant, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$|\ln 2 - q_n| \leq \frac{K}{n^5(3 + \sqrt{8})^n}.$$