DS N°4 (le 06/12/2014)

Problème 1 (extrait de CCP MP 2012)

Dans tout le problème, $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f_n$ est une série de fonctions définies sur un intervalle I de \mathbb{R} et à valeurs réelles.

Partie I

Une série de fonctions $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f_n$ converge absolument sur I lorsque, pour tout $x\in I$, la série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} |f_n(x)|$ converge. Dans les deux premières questions on supposera, pour simplifier les démonstrations, que toutes les fonctions f_n sont bornées sur I.

- 1. a) Rappeler la définition de la convergence normale de la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$ sur I.
 - **b**) On suppose que la série de fonctions $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f_n$ converge normalement sur I. Démontrer que $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f_n$ converge absolument sur I.
- 2. On suppose que la série de fonctions $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f_n$ converge normalement sur I. Démontrer que $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f_n$ converge uniformément sur I. On pourra démontrer que la suite des restes converge uniformément sur I vers la fonction nulle.
- 3. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$: $f_n(x) = (-1)^n \frac{x^2 + n}{n^2}$.

 Démontrer que la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$ converge simplement puis converge uniformément sur [0,1] mais ne converge absolument en aucune valeur de [0,1].
- 4. Si la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$ converge absolument sur I, a-t-on nécessairement $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$ qui converge uniformément sur I ?

 On attend une réponse détaillée, et on pourra utiliser une série entière.

Partie II

Dans toute cette partie, $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite décroissante de réels positifs, I=[0,1[et pour tout $n\in\mathbb{N}^*$ et tout $x\in I: f_n(x)=\alpha_n x^n(1-x)$.

- 5. Justifier que la suite $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est bornée et que la série de fonctions $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f_n$ converge simplement sur I.
- **6.** a) Calculer pour $n \ge 1$, $||f_n||_{\infty} = \sup_{x \in I} |f_n(x)|$.
 - **b**) Démontrer que la série de fonctions $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f_n$ converge normalement sur I si et seulement si la série de réels positifs $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{\alpha_n}{n}$ converge.
- 7. a) Calculer pour tout $x \in I$: $\sum_{k=n+1}^{+\infty} x^k$.

b) Si on suppose que la suite $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers 0, démontrer que la série de fonctions $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f_n$ converge uniformément sur I.

On pourra observer que pour $k \ge n+1$, $\alpha_k \le \alpha_{n+1}$.

- c) Réciproquement, démontrer que si la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$ converge uniformément sur I, alors la suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0.
- 8. Dans chacun des cas suivants, donner, en détaillant, un exemple de suite décroissante de réels positifs $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ telle que :
 - a) La série de fonctions $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f_n$ converge normalement sur I.
 - **b**) La série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$ ne converge pas uniformément sur I.
 - c) La série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$ converge uniformément sur I mais ne converge pas normalement sur I.
- **9.** Résumer à l'aide d'un schéma toutes les implications possibles, pour une série de fonctions quelconque, entre les convergences : normale, uniforme, absolue et simple sur I.

PROBLÈME 2 (Épreuve pratique MINES-PONTS 1994)

L'objectif de ce problème est l'étude de la fonction ζ (dite *fonction zêta de Riemann*).

La première partie est consacrée à l'étude globale de cette fonction ζ ; la deuxième partie aux calculs de valeurs numériques de ζ au voisinage de 1 en faisant appel à une méthode d'accélération de convergence; enfin, la troisième partie précise le comportement asymptotique de ζ au voisinage de 1.

Dans tout le problème, N et n désignent des entiers supérieurs ou égaux à 1.

Première partie

Désignons par f_n , S_N et R_N les trois fonctions définies par les relations :

$$f_n(x) = \frac{1}{n^x}$$
 ; $S_N(x) = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x}$; $R_N(x) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$

Les deux premières fonctions sont définies sur \mathbb{R} ; la fonction R_N est définie lorsque la série de terme général $f_n(x)$ est convergente.

- 1. a) Démontrer que la série de terme général $f_n(x)$ est convergente dans l'intervalle $I =]1, +\infty[$.
 - b) Prouver que les trois séries de fonctions de termes généraux respectifs f_n , f'_n et f''_n sont uniformément convergentes sur tout intervalle $[a, +\infty[$ contenu dans I.
 - c) Est-ce qu'il y a convergence uniforme pour ces trois séries de fonctions dans I?

Par définition, ζ est la fonction somme de la série de fonctions de terme général f_n :

$$\forall x \in I$$
, $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

2. a) Démontrer que la fonction ζ est de classe \mathscr{C}^2 sur l'intervalle I et donner les expressions de ζ' et de ζ'' .

– DS N°4 – **PSI* 14-15**

b) Démontrer, pour tout réel x de l'intervalle I et pour tout entier $N \in \mathbb{N}^*$ l'encadrement :

$$\frac{1}{(x-1)(N+1)^{x-1}} \le R_N(x) \le \frac{1}{(x-1)N^{x-1}} \cdot$$

En déduire un encadrement de $\zeta(x)$ valable pour tout entier N.

- c) Étudier les limites de $\zeta(x)$ lorsque x tend vers 1 par valeurs supérieures et lorsque x tend vers $+\infty$.
- **d)** Donner un équivalent de $\zeta(x)$ lorsque x tend vers 1^+ .
- 3. a) Utiliser l'encadrement obtenu en 2.b pour écrire une fonction en Python zeta (x, eps) qui renvoie une valeur approchée de $\zeta(x)$ à eps près.
 - **b**) Donner l'allure de la courbe représentative de la fonction ζ .
 - c) Écrire un programme en Python qui réalise ce tracé sur l'intervalle]1,10] en utilisant la fonction précédente.

Deuxième partie

Les résultats obtenus précédemment ne permettent pas un calcul précis et rapide de $\zeta(x)$ pour des valeurs de x voisines de 1. L'objectif de cette partie est de proposer, pour de telles valeurs, une méthode d'accélération de convergence.

Étant donnés un réel x et un entier n strictement supérieurs à 1, désignons par φ_n la fonction $u\mapsto \varphi_n(u)$ définie sur l'intervalle $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ par la relation :

$$\varphi_n(u) = \int_{n-u}^{n+u} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{t^x}\right) dt.$$

- 1. a) Démontrer que la fonction φ_n est de classe \mathscr{C}^{∞} sur l'intervalle $\left[0,\frac{1}{2}\right]$; calculer $\varphi_n(0)$, $\varphi_n'(0)$ et $\varphi_n''(0)$.
 - **b**) Démontrer, pour tout entier n > 1 et pour tout réel x de I la relation :

$$f_n(x) = \int_{n-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{t^x} + \varphi_n\left(\frac{1}{2}\right).$$

c) Démontrer l'encadrement :

$$\frac{x(x+1)}{24} \frac{1}{(n+1)^{x+2}} \leq -\phi_n \left(\frac{1}{2}\right) \leq \frac{x(x+1)}{24} \frac{1}{[n-1)^{x+2}} \cdot$$

(on pourra utiliser une formule de Taylor).

d) Soit *x* un réel et N un entier strictement supérieurs à 1 ; en utilisant les deux questions précédentes et la question **I.2.b**, démontrer la double inégalité :

$$\frac{x}{24(N+2)^{x+1}} \le \frac{1}{(x-1)\left(N+\frac{1}{2}\right)^{x-1}} - R_N(x) \le \frac{x}{24(N-1)^{x+1}} \cdot \frac{x}{24(N-1)^{x+1}} = \frac{x}{24(N-1)^{x+1}} =$$

2. Utiliser l'encadrement précédent pour écrire une fonction en Python zeta2(x,eps) qui renvoie une valeur approchée de $\zeta(x)$ à eps près.

Comparer les temps d'exécution de cette fonction avec celle écrite en I.3.a.

Troisième partie

1. On considère la suite $(g_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ des fonctions définies sur \mathbb{R}_+^* par la relation :

$$g_n(x) = S_n(x) - \int_1^n \frac{\mathrm{d}t}{t^x}.$$

 S_n est la fonction définie sur \mathbb{R}_+^* : $S_n(x) = 1 + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} + \dots + \frac{1}{n^x}$

a) Démontrer que cette suite $(g_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est simplement convergente sur \mathbb{R}_+^* (on pourra considérer la série de terme général $g_{n+1}(x)-g_n(x)$).

Soit g la fonction limite. Préciser la restriction de la fonction g à l'intervalle I (en fonction de ζ).

b) Démontrer, pour tout réel x strictement positif et tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, la relation :

$$-\frac{1}{n^x} \leqslant g(x) - g_n(x) \leqslant 0.$$

- c) Établir que g est continue sur \mathbb{R}_+^* .
- 2. Démontrer que l'expression $\zeta(x) \frac{1}{x-1}$ admet une limite égale à g(1) lorsque x tend vers 1 par valeurs supérieures.

